

Рецептсіз және рецепт бойынша босатылатын дәрілік препараттар санаттарын айқындау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2024 жылғы 17 қыркүйектегі № 107 шешімі

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 30-бабына, 2014 жылғы 23 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде дәрілік заттар айналысының бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісімнің 3 және 4-баптарына, Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссияның Жұмыс регламентіне № 2 қосымшаның 30-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 178 шешімімен бекітілген Рецептсіз және рецепт бойынша босатылатын дәрілік препараттар санаттарын айқындау қағидаларына өзгерістер енгізілсін.

2. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының "Дәрілік препараттардың құрамына кіретін әсер етуші заттарды ескере отырып, оларды рецептсіз және рецепт бойынша босатылатын дәрілік препараттар санатына жатқызу қағидалары туралы" 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 30 ұсынымы осы Шешім күшіне енген күннен бастап қолданылуға жатпайды.

3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

*Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасы Төрағасының
міндетін атқарушы*

Б. Сұлтанов

Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2024 жылғы 17 қыркүйектегі
№ 107 шешіміне
ҚОСЫМША

Рецептсіз және рецепт бойынша босатылатын дәрілік препараттар санаттарын айқындау қағидаларына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 14-тармақ "келмеуге тиіс" деген сөздерден кейін "және қосымшаға сәйкес жекелеген әсер етуші заттардың арнайы критерийлеріне сәйкес келуге тиіс" деген сөздермен толықтырылсын.

2. 29-тармақтың "г" тармақшасындағы және 44-тармақтың "д" тармақшасындағы " дәрілік препараттар" деген сөздер "дәрілік препарат" деген сөздермен ауыстырылсын.

3. Мынадай мазмұндағы қосымшамен толықтырылсын:

Рецептсіз және рецепт бойынша босатылатын дәрілік препараттар санаттарын айқындау қағидаларына
ҚОСЫМША

Белгілі бір шарттар сақталған кезде рецептсіз босатылатын дәрілік препараттардың құрамына кіретін жекелеген белсенді заттарға арналған арнайы критерийлер

Халықаралық патенттелмеген атауы	АТХ коды	Енгізу жолы	Көрсеткіштік р	Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтағы қосымша мәліметтер	МД	ВСД	МКВ
Азелаиновая қышқылы	D10AX03	теріге	ювениль акне	20 жасқа толмаған пациенттер			
Азеластин	R01AC03	мұрынға тамызу	аллергиялық ринит	ескерту: ересектер мен 5 жастан асқан балаларды қысқа мерзімді емдеу үшін ғана. МД 0,14 мг/0,14 мл (1 бұрқу)	0,1 %	0,56 мг	
Азеластин	S01GX07	көзге	аллергиялық конъюнктивит	ескерту: тек 5 жастан асқан адамдарға қысқа мерзімді пайдалану үшін; МД 0,14 мг/0,14 мл (1 бұрқу)	0,14 мг	0,56 мг	
Алюминий гидроксиді	A02AB01	ішке					
Алюминий хлориді	D10AX01	теріге					
				жөтел мен суыққа			

Амброксол	R05CB06	ішке		қарсы заттар: экспекторанттар, муколитиктер	60 мг		
Аморолфин	D01AE16	теріге					
Ацетилсалицил қышқылы	N02BA01	ішке		балаларда, егер қарсы көрсетілімдер негізінде алынып тасталмаса, медициналық персоналдың бақылауымен ғана қолданылады	1 г	4 г	
Ацетилсалицил қышқылы	B01AC06	ішке	өтпелі ишемиялық шабуыл		300 мг	300 мг	
Ацетилсалицил қышқылы	B01AC06	ішке	цереброваскулярлық және кардиоваскулярлық тромбоздық аурулардың алдын алу, шунтирлаудан кейін			100 мг	
Ацетилцистеин	R05CB01	ішке		жөтел мен суыққа қарсы заттар: экспекторанттар, муколитиктер			
Ацикловир	D06BB03	теріге	Herpes labialis	ересектер мен 12 жастан асқан балалар; қысқа мерзімді емдеу			100 мг

				Herpes labialis ("суық тию")	5 %		
Комбинация-дағы ацикловир	D06BB53	теріге	қайталанатын Herpes labialis ерте көріністері мен белгілерін емдеу	ерекшеліктер: тері арқылы қолдану, терапияның максималды ұзақтығы 5 күн; иммунокомпромиріленген ересектер мен 12 жастан асқан балалар; МД: ацикловир 5 % және гидрокортизон 1 %; МКВ: 100 мг ацикловир және 20 мг гидрокортизон. Ұсынымдар құрамында 5 % ацикловир және 1% гидрокортизон бар дәрілік препараттарға жатады			
Беклометазон	R01AD01	мұрынға тамызу	аллергиялық маусымдық ринит	18 жастан асқан ересектер, қысқа мерзімді терапия	200 мкг	400 мкг	
Бензалконий	D08AJ01	теріге					
Бензидамин	A01AD02	жұтқыншаққа			0,15 %		
				буындардағы, бұлшықетте			

Бензидамин	M02AA05	теріге	жабық жарақаттард ан, құрысулард ан, лумбагодан кейінгі ауырсыну және ісіну	рдегі ауырсыну үшін жергілікті қолдануға арналған стероидты емес қабынуға қарсы препараттар (бұдан әрі – ҚҚСД) ретінде			
Бензоил пероксиді	D10AE01	теріге	acne vulgaris емдеу	безеуді емдеу ретінде	10 %		
Бензокаин	C05AD03	теріге					
Бензокаин	D04AB04	теріге					
Бензокаин	R02AD01	жұтқыншақ қа					
Бисакодил	A06AB02	ішке		қысқа мерзімді қолдану үшін			
Бифоназол	D01AC10	теріге					
Бор қышқылы	D08AD	теріге		3 жасқа дейінгі балаларға қарсы; жалпы денеге қолдануға болмайды	3 %		
Бромгексин	R05CB02	ішке					
Бутамират	R05DB13	ішке		жөтелге қарсы дәрі ретінде	30 мг	100 мг	
Бутетамат		ішке			70 мг	200 мг	
Бутилскопо ламин	A03BB01	ішке		асқазан-іше к жолдарыны ң (бұдан әрі – АІЖ) функционал дық бұзылыстар ын емдеу құралы ретінде	10 мг		

Бутилскополамин	A03BB01	ректальды		А І Ж функционалдық бұзылыстарын емдеуге арналған зат ретінде	10 мг		
Гвайфенезин	R05CA03	ішке					
Гексэтидин	A01AB12	жұтқыншаққа					
Гексилрезорцин	R02AA12	жұтқыншаққа					
Гельземин (жасмин)		ішке			0,5 мг		
Гепарин	C05BA03	теріге					
Гидрокортизон	C05AA01	ректальды	геморроидальдыға қарсы, қышымаға қарсы заттар	құрамында кортикостероидтар бар геморроидальды зат ретінде	1 %		
Гидрокортизон	D07AA02	теріге	байланысты аллергиялық дерматит, жәндіктердің шағуы	жалпы денеге қолдану үшін емес; Тек ересектер үшін; емдеудің максималды ұзақтығы 7 күн	1 %		150 мг
Гидроталцит	A02AD04	ішке					
Гимекромон	A05AX02	ішке		өт айдайтын зат ретінде	200 мг		
Глицерол	A06AX01	глицерол					
Гоматропин	S01FA05	көзге		мидриатик, циклоплегик ретінде			
Деквалинхлориді	R02AA02	жұтқыншаққа					
Декспантенол	A11HA30	ішке					
Диклофенак	M01AB05	ішке	анальгетик, антипиретик		25 мг	75 мг	750 мг
Диклофенак	M02AA15	теріге			5 %		

Диметилсульфоксид	M02AX03	теріге		бұлшықет және буын ауруы үшін жергілікті пайдаланатын зат ретінде	20 %		
Диметинден	D04AA13	теріге					
Диметинден	R06AB03	ішке			4 мг	4 мг	40 мг
Дифенгидрамин	D04AA32	теріге					
Дифенгидрамин	R06AA02	ішке	қозғалыс аурулары (кинетоздар)	6 жастан асқан балаларға. Ұйқысыздық пен аллергияны емдеуге арналған психотроптық заттар тізіміне енгізілген	50 мг	50 мг	
Дифенилпираллин	R06AA07	ішке		ескерту: 12 жасқа дейінгі балаларда қолдануға болмайды, қабылдау ұзақтығы 14 күнге дейін	2 мг	10 мг	100 мг
Докозанола	D06BB11	теріге					
Домперидон	A03FA03	ішке		А І Ж функционалды құбылыстарын емдеу құралы ретінде. Ерекшелік: ересектер мен 12 жастан асқан балаларға арналған рецептсіз			
				А І Ж функционалды құбылыстар			

Домперидон	A03FA03	ректальды		ын емдеу кұралы ретінде. Ерекшелік: ересектер мен 12 жастан асқан балаларға арналған рецептсіз			
Темір және мультидәрумендер	B03AE03	ішке		анемияны емдеуге арналмаған			
Темір, полидәрумендер мен минералдар	B03AE04	ішке		анемияны емдеуге арналмаған			
Ибупрофен	M01AE01	ішке	анальгетик, антипиретик, қабынуға қарсы заттар	НПВС ретінде	400 мг	1200 мг	
Ибупрофен	M02AA13	теріге	анальгетик, антипиретик, қабынуға қарсы заттар	буын, бұлшықет ауруы үшін жергілікті пайдалануға НПВС ретінде	5 %	1200 мг	
Идроциламид	M02AX05	теріге					
Изоконазол	G01AF07	қынаптық					
Изоконазол	D01AC05	теріге		котырға қарсы зат ретінде жергілікті қолдану үшін	2 %		
Изопропамид	A03AB09	ішке		АІЖ функционалды қбұзылыстарын емдеу заты ретінде	5 мг		
Индометацин	M01AB01	теріге		НПВС ретінде			
				НПВС буындардағы, бұлшықетте			

Индометаци н	M02AA23	теріге		рдегі ауырсынуға қарсы жергілікті қолдануға арналған			
Йод	D08AG03	теріге					
Кадексомер	D03AX01	теріге		жараларды емдеуде кептіру заты ретінде			
Кальций және комбинация дағы колекальци ферол	A12AX00	ішке		ерекшелік: ауызға қолдану үшін; МД: 600 МЕ колекальци ферол			
Кальций карбонаты	A02AC01	ішке					
Кальций добезилаты	C05BX01	ішке	созылмалы веноздық жеткіліксіздік		500 мг		
Карбинокса мин	R06AA08	ішке		аллергиялы қ ринитке қысқа мерзімді қолдану; не ол 24 айға дейінгі балаларға қолданылад ы			
Кетоконазо л	D01AC08	теріге			2 %		
Кетоконазо л	G01AF11	қынаптық					
Кетопрофен	M01AE03	ішке		терапияның максималды ұзақтығы 5 күн	25 мг	75 мг	375 мг
Кетотифен	R06AX17	ішке		ескерту: ересектер мен 6 жастан асқан балаларға	1 мг	4 мг	120 мг
				ескерту: 12 жасқа дейінгі			

Клемастин	R06AA04	ішке		балаларға қолданылма йды. 2 аптадан артық қолданылма йды	1 мг	6 мг	20 мг
Клиохинол	D08AH30	теріге		дерматолог и я д а антисептик ж ә н е дезинфекци ялаушы ретінде			
Клобутинол	R05DB03	ішке					
Клотримазол	G01AF02	қынаптық			2 % (500 мг)		
Клотримазол	D01AC01	теріге		қотырға қарсы жергілікті қолданылат ын зат ретінде	1 %		
Кромоглиций қышқылы	S01GX01	көзге		офтальмоло гиялық зат ретінде			
Кромоглиций қышқылы	R01AC01	мұрынға тамызу	маусымдық ж ә н е тұрақты аллергиялы қ риниттің алдын алу				
Ксилометазолин	R01AA07	мұрынға тамызу	мұрын бітелуін, тұрақты ж ә н е маусымдық аллергиялы қ ринитті (поллинозды қоса), синуситті симптомати калық емдеу				
Лактитол	A06AD12	ішке	іш өтуге қарсы				
				і ш жүргізетін дәрі ретінде . Бауыр			

Лактулоза	A06AD11	ішке	і ш жүргізетін дәрі	энцефалопатиясын емдеу жағдайында рецепт бойынша босату			
Левакабастин	R01AC02	мұрынға тамызу	маусымдық және тұрақты аллергиялық ринитті симптоматикалық емдеу	жергілікті қолдануға арналған деконгестант ретінде	50 мг		
Левакабастин	S01GX02	көзге		жергілікті қолдануға арналған деконгестант ретінде	0,05 %		
Левокарнитин	A16AA01	ішке		ескерту: ішке қабылдау			
Левоноргестрел	G03AC03	ішке	шұғыл контрацепция	гестагенді контрацептив ретінде. Айрықша нұсқау: рецептсіз шұғыл контрацепция үшін 2 таблеткадан босату	1,5 мг		1,5 мг
Левоцетиризин	R06AE09	ішке	аллергиялық ринит және есекжем	ересектер мен 6 жастан асқан балаларға; емдеудің максималды ұзақтығы 10 күн	5 мг		50 мг
Лидокаин	C05AD01	теріге		құрамында жергілікті анестетиктер бар геморроидальдыққа қарсы зат ретінде			
Лидокаин	D04AB01	теріге					

Лидокаин	R02AD02	жұтқыншаққа		жұтқыншақ тың шырышты қабығына жағуға арналған анестетик ретінде			
Лобелин		ішке			3 мг (0,5 %)		
Лоперамид	A07DA03	ішке			2 мг		40 мг
Лоратадин	R06AX13	ішке		антигистам индік зат ретінде	10 мг	10 мг	300 мг
Малатион	P03AX03	теріге		педикулезге қарсы дәрі ретінде	1 %		
Мебендазол	P02CA01	ішке			100 мг		
Меклозин	R06AE05	ректальды					
Меклозин	R06AE05	ішке	қозғалыс аурулары (кинетозы)	ескерту: ересектер мен 12 жастан асқан балаларға	50 мг		
Метоксамин	C01CA10	мұрынға тамызу					
Миконазол	A07AC01	жұтқыншаққа					
Миконазол	D01AC02	теріге			250 мг (2 %)		
Миконазол	G01AF04	қынаптық			250 мг (2 %)		
Комбинациядағы миконазол гидрокортизонмен бірге	D01AC52	теріге			2 % мико-назол және 1 % гидрокортизон	2 %	
Миноксидил	D11AX01	теріге	18-65 жас аралығындағы ерлер мен әйелдердегі андрогендік алопецияны емдеу		2 %		
Мультиэнзимы	(A09AA02	ішке		монотерапия ретінде қолданған кезде, барлық басқа жағдайлард			

липаздар, протеаздар және т.б.)				а дәрігердің бақылауыме н шексіз			
Напроксен	M01AE02	ішке	анальгетик, антипирети к, қабынуға қарсы заттар	НПВС ретінде	200 мг	600 мг	
Напроксен	M02AA12	теріге	анальгетик, антипирети к, қабынуға қарсы заттар	НПВС буындардағ ы , бұлшықетте рдегі ауырсынуға қарсы жергілікті колдануға арналған	10 %	600 мг	
Натрий селенаты	A12CE01	ішке					
Натрий фториді	A01AA30	ішке					
Нафазолин	R01AA08	мұрынға тамызу					
Нафазолин	R01AB02	мұрынға тамызу					
Нафазолин	S01GA01	көзге					
Неомицин	S01AA03	көзге		микробқа қарсы офтальмоло гиялық зат ретінде			
Неомицин, комбинация дағы бацитрацин	D06AX04	теріге		т е к ересектер мен 12 жастан асқан балаларға колдану үшін; 7 күннен аспайды; жалпы денеге колдануға болмайды			
Никотин	N07BA01	мұрынға тамызу		никотинге тәуелділікті емдеу заты ретінде			

Никотин	N07BA01	тіл асты		никотинге тәуелділікті емдеу заты ретінде			
Никотин	N07BA01	тері астына		никотинге тәуелділікті емдеу заты ретінде			
Нистатин	D01AA01	ішке		дәрігермен алдын ала кеңесу қажет	100 000 ЕД		
Нистатин	G01AA01	қынаптық	қынаптық кандидозды емдеу	кортикостероидтармен және антибиотиктермен комбинацияларды қоспағанда, инфекцияға қарсы зат ретінде			
Нитрофурал	D08AF01	теріге		антисептик және дезинфекциялаушы ретінде	0,2 %		
Нитрофурал	D09AA03	теріге		жараларды емдеуде медициналық (жақпа) таңғыштар ретінде	0,2 %		
Нифлумий қышқылы	M02AA17	теріге		НПВС буындардағы, бұлшықеттердегі ауырсынуға қарсы жергілікті қолдануға арналған	3 %		
Оксиконазол	D01AC11	теріге		котырға қарсы зат ретінде жергілікті қолдану үшін			
Оксиметазолин	S01GA04	көзге					

Оксомемазин	R06AD08	ішке		ескерту: ересектер мен 12 жастан асқан балаларға арналған	4 мг	10 мг	
Омепразол	A02BC01	ішке	рефлюкс пен қыжылды емдеу		20 мг	20 мг	280 мг
Омоконазол	D01AC13	теріге					
Орлистат	A08AB01	ішке					
Орципреналин	R03CB03	ішке		демiкпе мен созылмалы обструктивті өкпе ауруларын емдеу құралы ретінде	20 мг		
Пантопризол	A02BC02	ішке	қыжыл, қышқылдың регургитациясы, қысқа мерзімді рефлюкс терапиясы	ескерту: емдеу дәрігермен кеңесусіз 4 аптадан аспауы тиіс	20 мг	20 мг	280 мг
Папаверин	A03AD01	ішке		ішектің функционалды бұзылыстарын емдеу құралы ретінде	50 мг		
Парацетамол	N02BE01	ішке		МКВ < 10 г; анальгетик ретінде	1 г		10 г
Пентоксиверин	R05DB05	ішке		тек ересектер үшін			
Пенциклови́р	D06BB06	теріге	Herpes labialis	ересектер мен 12 жастан асқан балаларға; Herpes labialis ерте симптомдарының қысқа мерзімді			20 мг

				терапиясы үшін ("суықтыю")	1 %		
Пирантел	P02CC01	ішке		антинематодтық зат ретінде	250 мг		
Пиридоксин	A11HA02	ішке					
Пироксикам	M02AA07	теріге	жабық жаракаттардан, құрысулардан, лумбагодан кейінгі ауырсыну және ісіну	НПВС буындардағы, бұлшықеттердегі ауырсынуға қарсы жергілікті қолдануға арналған	0,5 %		
Повидон-йод	G01AX11	қынаптық					
Полидоканол	C05BB02	теріге			10 % (20 мг)	100 мг	
Прамокаин	D04AB07	теріге					
Прокаин	C05AD05	теріге					
Пропифеназон	N02BB04	ішке			1 г		
Псевдоэфедрин	R01BA02	ішке		мұрын деконгестанты ретінде	60 мг		
Ранитидин	A02BA02	ішке		асқазан жарасы мен гастрозофагеальді рефлюкс ауруын емдеуге арналған зат ретінде (бұдан әрі – ГЭРБ)	75 мг		
Рацекадотрил	A07XA04	ішке	жедел диареяны емдеу	тек ересектер үшін; қысқа мерзімді терапия, 3 күннен аспайды, тәулігіне ең көбі 300 мг			
				монотерапия да, сондай-ақ D			

Ретинол	A11CA01	ішке		дәруменімен бірге де		10 000 ME	
Селена қосылысы	D11AC03	теріге					
Селена сульфиді	D01AE13	теріге					
Күміс нитраты	D08AL01	теріге					
Силимарин	A05BA03	ішке					
Суксibuзон	M02AA22	теріге		НПВС буындардағы, бұлшықеттердегі ауырсынуға қарсы жергілікті қолдануға арналған			
Сульфоназол	D01AC09	теріге					
Күміс сульфадиазині	D06BA01	теріге	болмашы күйіктер	тек ересектер үшін, шағын ошақтарға қолдану 7 күннен аспайды	1 %		50 мг
Сульфаметизол	S01AB01	көзге		офтальмологиялық инфекцияға қарсы зат ретінде			
Сульфацетамид	S01AB04	көзге		офтальмологиялық инфекцияға қарсы зат ретінде			
Тербинафин	D01AE15	теріге			1 %		
Тетракаин	C05AD02	теріге					
Тетракаин	D04AB06	теріге					
Тиабендазол	P02CA02	ішке		антинематодтық зат ретінде	50 мг		
Тиамин (В ₁ дәрумені)	A11DA01	ішке		ерекшелікте р: тек ауыз қабылдау үшін			

Тиёмоний йодиді	A03AB17	ішке		А І Ж функционалдық бұзылыстарын емдеу заты ретінде	30 мг		
Тиоконазол	D01AC07	теріге		котырға қарсы зат ретінде жергілікті қолдану үшін	1 %		
Токоферол (Е дәрумені)	A11HA03	ішке					
Толнафтат	D01AE18	теріге					
Триамцинолон	A01AC01	жұтқыншаққа		тек ересектер үшін; қысқа мерзімді қолдану 5 күннен аспайды	0,5 %		
Триклозан	D08AE04	теріге					
Триоксизален	D05BA01	ішке		жүйелік қолданудың антипсориазикалық заты ретінде	5 мг		
Трипролидин	R06AX07	ішке					
Троксерутин	C05CA04	теріге					
Тромантадин	D06BB02	теріге	Herpes labialis ерте сатыдағы қысқа мерзімді терапиясы үшін (везикулалар пайда болғанға дейін)	ересектер мен 12 жастан асқан балаларға; тек ерте қолдану үшін; жүйелік сіңіру және жағымсыз әсер ету қаупі төмен	1 %		2 г
Ундециленкышқылы	D01AE04	теріге	спортшының табанын емдеу және профилактика				

Фамотидин	A02BA03	ішке		асқазан жарасы мен ГЭРБ емдеу заты ретінде	10 мг		
Фелбинак	M02AA08	теріге			3 %		
Фенилбутазон	M02AA01	теріге		НПВС буындардағы, бұлшықеттердегі ауырсынуға қарсы жергілікті қолдануға арналған			
Фенилэфрин	R01AA04	мұрынға тамызу		мұрын деконгестанты ретінде			
Фентиконазол	D01AC12	теріге					
Фепразон	M02AA16	теріге		НПВС буындардағы, бұлшықеттердегі ауырсынуға қарсы жергілікті қолдануға арналған			
Флуконазол	D01AC15	теріге					
Флурбипрофен	M01AE09	жұтқыншаққа					
Флурбипрофен	R02AX01	жұтқыншаққа		т е к ересектерге арналған			
Флутримазол	D01AC16	теріге					
Флуфенам қышқылы	M01AG03	теріге		НПВС ретінде	4 %		
Фоллий қышқылы	B03BB01	ішке			4 мг		
Фрамицетин	D09AA01	теріге		дәрілік (жақпа) таңғыштар түрінде инфекцияға қарсы зат ретінде			
Хинизокаин	D04AB05	теріге					

Хлорфенамин	R06AB04	ішке	маусымдық аллергиялық ринит, конъюнктивит	ескерту: қысқа мерзімді қолдану, 12 жастан асқан балаларға	4 мг	24 мг	80 мг
Цетиризин	R06AE07	ішке			10 мг	10 мг	300 мг
Циклизин	R06AE03	ішке	қозғалыс ауруы (кинетоз)	антигистаминдік зат ретінде	50 мг		
Циклопирокс	D01AE14	теріге					
Циметидин	A02BA01	ішке			200 мг		
Құрамында цинк бар заттар	D02AB	теріге					
Циннаризин	N07CA02	ішке		бас айналу мен вестибулярлық бұзылуларды емдеуге арналған зат ретінде	5 мг		
Цинхокаин	D04AB02	теріге					
Цинхокаин	C05AD04	теріге					
Ципрогептадин	R06AX02	ішке	аллергиялық ринит, конъюнктивит	ескерту: алкогольмен бір мезгілде қабылдауға тыйым салынады; ересектермен 12 жастан асқан балаларға арналған	4 мг	12 мг	360 мг
Эконазол	D01AC03	теріге		котырға қарсы зат ретінде жергілікті қолдану үшін	2 %		
Эрготамин	N02CA02	ішке		мигренге қарсы зат ретінде	0,6 мг		

Эрготамин	N02CA02	ректальды		мигренге қарсы зат ретінде	0,6 мг		
Этилэфрин	C01CA01	ішке		кардиостимулятор ретінде	5 мг		
Этофенамат	M02AA06	теріге	жабық жарақаттардан, құрысулардан, лумбагодан кейінгі ауырсыну және ісіну	НПВС буындардағы, бұлшықеттердегі ауырсынуға қарсы жергілікті қолдануға арналған			
Эфедрин	R01AB05	мұрынға тамызу		кортикостероидтармен комбинациясыз жергілікті қолданылатын симпатомиметик ретінде	2 %		
Эфедрин	R01AA03	мұрынға тамызу		комбинациясыз жергілікті қолданылатын симпатомиметик ретінде	2 %		

Ескертпе. Осы тізбеде төмендегілерді білдіретін қысқартулар қолданылады:

МД – дәрілік нысанның ең жоғары дозасы (концентрациясы);

ВСД – дәрілік препаратты медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген ең жоғары тәуліктік доза;

МКВ – дәрілік препараттың тұтыну қаптамасындағы әсер етуші заттың ең көп мөлшері.".