

Амбулаториялық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шенберінде халыққа тегін және женілдікпен қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбелерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 4 қыркүйектегі № 446 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 24 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізліміне № 5799 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2011 жылғы 4 қарашадағы № 786 Бұйрығымен.

Ескерту. 2012.01.01 бастап күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2011.11.04 № 786 (6-тармақты қараңыз) Бұйрығымен.

Қолданушылардың назарына!

Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 6-тармақтан қараңыз.

"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі" туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 88-бабына сәйкес, тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шенберінде халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру максатында,

БҰЙЫРАМЫН:

1 . М ы н а л а р :

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 1,0 өтеу коэффициентімен, белгілі бір аурулары (жай-күйлері) және мамандандырылған емдік өнімдерімен амбулаториялық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шенберінде халыққа тегін және женілдікпен қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесін;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес 0,5 өтеу коэффициентімен, белгілі бір аурулары (жай-күйлері) амбулаториялық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шенберінде халыққа тегін және женілдікпен қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесін бекітсін.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармацевтикалық бақылау комитеті (Баймұқанов С.А.) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.

3. Әкімшілік-құқықтық жұмыс департаменті (Бисмильдин Ф.Б.) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден кейін ресми жариялауға жіберсін.

4. "Амбулаториялық емдеу кезінде дәрілік заттар мен мамандандырылған емдік тағам рецептер бойынша тегін әрі женілдікті шарттармен босатылатын аурулардың түрлері мен халықтың жекелеген санаттарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2007 жылғы 21 маусымдағы N 376 бұйрығының (Қазақстан Республикасының N 4805 нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген, 2007 жылғы 10 тамыздағы N 122 (1325) "Заң газетінде" жарияланған) күші жойылды

д е п т а н ы л с ы н .

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі Е.А. Біртановқа жүктелсін.

6. Осы бұйрық 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрі

Ж. Досқалиев

Қазақстан

Республикасы

Денсаулық

сақтау

министрінің

2009

жылғы

4

қыркүйектегі

N 446

бұйрығына

1-қосымша

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - КР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2011.08.12 № 532 (ресми жариялаған күнінен кейін күнтізбектік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

**1,0 өтеу коэффициентімен, белгілі бір аурулары
(жай-қүйлері) және мамандандырылған емдік өнімдерімен
амбулаториялық деңгейде тегін медициналық көмектің
кеңілді көлемі шенберінде халықта тегін және женілдікпен
қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар және медициналық
мақсаттағы бұйымдар тізбесі**

1. Жергілікті бюджет қаржаты есебінен:

| | | |
|----------------------|---|--|
| Азаматтардың санаты | Аурулардың түрлері | Дәрілік заттардың атауы |
| Нәресте 2 айға дейін | Жаңа туу кезеңдегі аурулар (алдын-алу мен емдеу)* | Ана мен балаға арналған дәрі-дәрмек қобдишасы |
| | Медициналық көрсетімдер бойынша ерте жастан жасанды немесе коспалармен коректендіру* *,*** | Емшек сүтіне бейімделген қоспалар |
| | | Амоксициллин, пероралды суспензия 250 мг/5 мл; Амоксициллин+claveulan қышқылы, ішетін суспензияны |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| | Қабыну | дайындауға арналған ұнтақ 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг / 5 мл , ; Цефуроксим, ішілетін суспензия дайындау үшін гранулдар 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл; Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, ертінді 7,5 мг/1 мл; Парацетамол, ерітінді, ішілетін ұнтақ, суспензия, е м б а л а у ы з ы 80 мг ; Ишектік микрофлораның алмасуына заарсыз концентрат өнімдері, ішке қолдануға арналған тамшылар; Азитромицин, ішке қолдану үшін суспензияларды дайындауға арналған ұнтақ 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл, ішетін суспензияларды дайындауға арналған ұнтақ 100 мг/5 мл (6 айдан бастап); |
| 1 жасқа дейінгі балалар | Обструктивті бронхит | Сальбутамол, 100 мкг/дозалы аэрозоль, 4 мг, капсула небулайзерге арналған ерітінді; Амброксол, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл сироп, 7,5 мг/1 мл ерітінді ; Парацетамол, ерітінді, ішілетін ұнтақ, суспензия, е м б а л а у ы з ы 80 мг ; Амоксициллин + клавулон қышқылы, ішетін суспензияны дайындауға арналған ұнтақ 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг / 5 мл ; Ацетилцистеин, ішке қолдану үшін дайындауға арналған түйіршіктер 100 мг, 200 мг; |
| | Жіті респираторлы аурулар , Жіті бронхит | Парацетамол, суспензия, ерітінді, ішілетін ұнтақ, 80 мг е м б а л а у ы з ы ; Амброксол, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл сироп, 7,5 мг/мл ерітінді; Оксолин майы, 0,25% |
| | Жіті фарингит/тонзиллит | Амоксициллин, 250 мг/5 мл ішілетін суспензия; Амоксициллин+клавулан қышқылы, 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг /5 мл, 312 мг/5 мл ішілетін суспензия дайындау үшін гранулдар; Цефалексин, 125 мг, 250 мг/5 мл ішілетін суспензия дайындау үшін гранулдар; Парацетамол, суспензия, ерітінді, ішілетін ұнтақ, 80 мг ембалаузы; |
| | Жіті ішек жүқпалары (іш ету) | Пероралды-электролитті ертінді дайындау үшін түздар, ұнтақ ; Смектит, ұнтақ; |
| | Мешел (алдын алу және емдеу) | Эргокальциферол, майлы ерітінді; Колекальциферол, сулы ертінді; |
| 1 жастан 5 жасқа дейінгі балалар | Қабыну | Амоксициллин+клавулан қышқылы, 375 мг таблетка; 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг/5 мл, 457 мг/5 мл ішілетін суспензия дайындауға арналған ұнтақ; Цефуроксим, 250 мг, 500 мг таблетка; 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл ішілетін суспензия дайындауға арналған гранулдар; Амброксол, 30 мг таблетка; 75 мг капсула, 15 мг/5 мл, 30 мг/ 5 мл сироп, 7,5 мг/1 мл ерітінді; Парацетамол, 200 мг, 500 мг таблетка, ерітінді, ішуге арналған ұнтақ, суспензия 100 мг, 150 мг, 250 мг ембалаузы; Амоксицилин 125 мг, 250 мг, 500 мг таблетка; Азитромицин таблетка 125 мг, 250 мг, ішуге арналған ұнтақ, суспензия 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл; |

| | | |
|---|--|--|
| | Обструктивті бронхит | Сальбутамол, 100 мкг/дозалы аэрозоль, 2 мг, 4 мг капсула, 20 мл небулайзерге арналған ерітінді; Амброксол, 30 мг таблетка, 75 мг капсула, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл сироп, 7,5 мг/мл ерітінді |
| | Жіті респираторлық аурулар | Парацетамол, 200 мг, 500 мг таблетка, ерітінді, ішуге арналған ұнтақ, суспензия 100 мг, 150 мг, 250 мг ембалаузыз; Амброксол, 30 мг таблетка, 75 мг капсула, 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл сироп; 7,5 мг/мл ерітінді; Оксолин майы, 0,25%; |
| | Жіті фарингит/тонзиллит | Бензатин бензилпенициллин, 600 000 ЭБ инъекцияға арналған суспензияны дайындау үшін ұнтақ Амоксициллин+клавулан қышқылы, 375 мг, 625 мг таблетка; 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг/5 мл, 457 мг/5 мл ішілетін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг диспергирлеуші таблетка; |
| | Жіті ішек жұқпалары (іш өту) | Глюкозді-электролитті ерітінді дайындауға арналған тұздар, ұнтақ; Смектит ұнтақ; |
| | Энтеробиоз | Мебендазол, 100 мг шайнайтын таблетка |
| Жүкті әйелдер | Йод тапшылығы және темір тапшылығы анемиясы (алдын алу және емдеу) | Бір компонентті және құрамдастырылған құрамында кем дегенде 30 мг темірі бар темір препараттары таблеткалар, капсуларап, дражеर Аскорбин қышқылы, 50 мг, 100 мг, 500 мг драже, таблетка Фолий қышқылы, 1 мг таблетка; Калий йодиді, 100 мкг, 200 мкг таблетка; |
| | Темір тапшылығы анемиясы | Бір компонентті және құрамдастырылған құрамында 20 мг/мл аса темірі бар темір препараттары таблеткалар, капсуларап, дражеर Аскорбин қышқылы, 50 мг, 100 мг, 500 мг драже, таблетка, ішке қабылдайтын тамшылар 100 мг/мл; Фолий қышқылы, 1 мг таблетка; |
| Диспансерлік есепте тұратын балалар мен жасөспірімдердің аурулары | Асқазан-ішек трактісі аурулары (асқазан және ұлтабар ойық жарасы, гастрит, дуоденит) | Омепразол, 20 мг капсула; Эзомепразол, таблетка 20 мг; Панкреатин, құрамында липазасы кем дегенде 4 500 ЭБ бар таблетка, капсула, 250 мг, 500 мг, 250 мг/5 мл ішілетін суспензия; Висмута трикалий дицитраты, 120 мг қабықшамен қанталған таблетка Метронидазол, 250 мг таблетка |
| | Қабыну | Амоксициллин+клавулон қышқылы, 25 мг, 250 мг, 375 мг, 500 мг, 625 мг, 1000 мг таблетка; 156,25/5 мл; 228,5 мг/5 мл; 312,5 мг/5 мл; 457 мг/5 мл ішілетін суспензия дайындау үшін ұнтақ; Амоксициллин, 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг диспергирлеуші таблеткалар; Цефуроксим, 250 мг, 500 мг таблетка, 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл ішілетін суспензия дайындау үшін гранулдар; Азитромицин, 125 мг таблетка, 250 мг, 500 мг, 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл ішуге арналған суспензия дайындау үшін ұнтақ; Ацетилцистеин, 100 мг, 200 мг ішуге арналған ерітінді дайындау үшін гранулдар, 600 мг көпіршік таблеткалар; |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| | | Амброксол, 30 мг таблетка, 75 мг капсула, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл сироп; ,5 мг/мл ерітінді; Парацетамол, 200 мг, 500 мг таблетка, ішілетін ұнтақ, суспензия, 80 мг, 100 мг, 150 мг, 250 мг ембалаузы; |
| | Созылмалы брохит | Амброксол, 30 мг таблетка, 75 мг капсула, 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл сироп, 7,5 мг/мл ерітінді; Ацетилцистеин, 200 мг ішуге арналған ерітінді дайындау үшін гранулдар, 600 мг көпіршік таблеткалар; Цефоруксим, 250 мг, 500 мг таблетка, 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл ішілетін, суспензия дайындауға арналған гранулдар; Теофиллин, 100 мг, 200 мг, 300 мг таблетка, капсула; 350 мг ретард капсула, таблетка; Теофиллин, таблетка, капсула 100 мг, 200 мг, 300 мг, таблетка, капсула ретард 350 мг; Азитромицин, 125 мг таблетка, 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл, ішуге арналған суспензия дайындау үшін ұнтақ; |
| | Бронх демікпесі | Беклометазон, 100 мкг/дозалы, 250 мкг/дозалы аэрозоль; Сальбутамол, 100 мкг/дозалы аэрозоль, 4 мг, 8 мг капсула; 20 мл небулайзерлерге арналған ерітінді; Салметерол, 25 мкг/дозалы ингаляцияға арналған аэрозоль; Флутиказон, 50 мкг/дозалы, 125 мкг/дозалы, 250 мкг/дозалы аэрозоль ; Салметерол + Флутиказон пропионаты, 25/50 мкг, 25/125 мкг, 25/250 мкг аэрозоль, 50 мкг/100 мкг, 50 мкг/250 мкг, 50 мкг/500 мкг ингаляцияға арналған ұнтақ; Фенотерол, 100 мкг/дозалы аэрозоль; Ипратропий бромиді + фенотерол гидробромиді, ингаляцияға арналған 500 мкг + 250 мкг/ мл ерітінді, 50 мкг + 21 мкг/дозалы аэрозоль Теофиллин, 100 мг, 200 мг, 300 мг таблетка, капсула; 350 мг ретард капсуласы, таблеткасы; Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат, 160 мкг/4,5 мкг, 80 мкг/4,5 мкг пластикалық ингаляторда ингаляцияға арналған ұнтақ; |
| Барлық санаттар | Органдарды ауыстырып кондырганнан кейінгі жағдай, гемопоэтикалық діңгекті жасушалардың | Циклоспорин, 25 мг, 50 мг, 100 мг капсула; Мофетил мікофенолаты, 250 мг капсула; Преднизолон, 5 мг таблетка; Метилпреднизолон, 250 мг/4 мл інъекцияға арналған ерітінді дайындау үшін ұнтақ; Азатиоприн, 50 мг таблетка; Такролимус, 0,5 мг, 1 мг, 5 мг капсулалар; Иматиниб, 100 мг таблетка; Валганцикловир, қабықшамен қапталған таблеткалар 450мг; |
| АҚТҚ - жұқтырған аналардан туған | ЖКТБ, АҚТҚ - жұқпасы | Зидовудин, 200 мл ішілетін ерітінді, 10 мг/мл инфузияға арналған қоюлық, 100 мг капсула, таблетка; Ламивудин, 100 мг таблетка, 5 мг/мл, 240 мл ішілетін ерітінді ; Зидовудин/ламивудин, 300 мг/150 мг, № 6x10, № 100 қабықшамен қапталған таблеткалар; Невирапин, 200 мг таблетка, 50 мг/5 мл ішілетін суспензия; Ставудин, 30 мг, 40 мг капсула, 1 мг/мл, 200 мл ішілетін ерітінді үшін ұнтақ; Диданозин, 100 мг таблетка, 250 мг, 400 мг капсула, 2 г |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | балалар; балалар және жүкті әйелдер | ұнтақ; Абакавир, 300 мг таблетка, ішке қабылдайтын ерітінді 20 мг/мл; Нельфинавир, 250 мг таблетка, 144 г ішілетін ерітінді дайындау үшін ұнтақ; Лопиновир/ритонавир, 60 мл сауыттағы ішілетін ерітінді, капсула, таблетка 200/50 мг; Дарунавир, таблетка 300 мг; Эфавиренз, таблетка 600 мг; |
| Барлық санаттар | Гипофизар ергежейлілігі, Шерешевский-Тернер синдромы | Соматропин, 18 ХБ, 36 ХБ инъекцияға арналған ерітінді дайындауға лиофилденген ұнтақ, 5 мг, 10 мг инъекцияға арналған ерітінді; |
| | Жыныстықтың ерте дамуы | Трипторелин, 3,75 мг инъекцияға арналған ерітінді дайындау үшін ұнтақ; |
| | Фенилкетонурия | Құрамында фенилаланины жоқ және аз мөлшерде арнайы өнімдер; |
| | Церебральды сал ауруы | Вальпроев қышқылы, пролонгиралды әсері бар таблетка, капсулалар, пролонгиралды әсері бар гранулдар, драже 150 мг, 250 мг, 300 мг, 500 мг, сироп 100 мл 50 мг/мл (балаларға арналған); Топирамат, капсулалар 25 мг, 50 мг; |
| 18 жасқа дейінгі азаматтар | Гемофилия | Фактор VIII концентрат, лиофилденген ұнтақ 250 МЕ; 500 МЕ ; 1000 МЕ ; Фактор IX концентрат, лиофилденген ұнтақ 200 МЕ, 250 МЕ , 500 МЕ, 600 МЕ, 1000 МЕ; |
| Ересектер | Бронх демікпесі | Бекламетазон, 100 мкг/дозалы, 250 мкг/дозалы аэрозоль; Сальбутамол, 100 мкг/дозалы аэрозоль, 4 мг; 8 мг таблетка, капсула; 20 мл небулайзерге арналған ерітінді; Салметерол, 25 мкг/дозалы ингаляцияға арналған аэрозоль Салметерол + Флутиказон пропионаты, 25/50 мкг, 25/125 мкг, 25/250 мкг аэрозоль; 50 мкг/100 мкг; 50 мкг/250 мкг; 50 мкг/500 мкг ингаляцияға арналған ұнтақ; Фенотерол, 100 мкг/дозалы аэрозоль; Ипратропий бромиді + фенотерол гидробромиді, 500 мкг + 250 мкг/мл ингаляцияға арналған ерітінді, 50 мкг + 21 мкг/дозалы аэрозоль ; Преднизолон, 5 мг таблетка, 30 мг/мл инъекцияға арналған ерітінді ; Теофиллин, 100 мг, 200 мг, 300 мг таблетка, капсула; 350 мг таблетка, капсула ретард; Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, пластикалық ингалятордағы ингаляция үшін ұнтақ 160 мкг/4,5 мкг, 80 мкг /4,5 мкг; |
| | Бейспецификалы ойықжаралы колит және Крон ауруы | Месалазин, 0,25 мг таблетка; |
| | | Морфин, егуге арналған ерітінді ампулада 1%; Тримепиридина гидрохлорид, егуге арналған ерітінді ампулада 1 % , 2 % ; Трамадол, капсулалар 50 мг, ерітінді ампулада 50 мг/1 мл, суппозиторилер 100 мг ; Фентанил, терапиялық, трансдермалдық жүйе 12,5 мкг/с, 25 |

Барлық санаттар

Гемобластоздар мен
апластикалық анемияны
қоса алғандағы
онкологиялық аурулар

мкг/ч, 50 мкг/с, 75 мкг/ч, 100 мкг/с;
Кетопрофен, ампула 50 мг/мл, капсулалар 50 мг, таблетка
100 мг, 150 мг, суппозиторилер 100 мг;
Диазепам, егуге арналған ертінді ампулада 10 мг/2 мл,
таблетка 5 мг, 10 мг;
Циклоспорин, капсулалар 25 мг, 50 мг, 100 мг;
Хаттамаға сәйкес химиотерапия:
Флуороурацил, егуге арналған ертінді ампулада 5% , 5
м л - д а н ;
Кальция фолинат, капсулалар 15 мг, егуге арналған ертінді
10 мг/мл, егуге арналған ертіндіні дайындау үшін
лиофилизирленген ұнтақ, флаконда 10 мг, 25 мг;
Циклофосфамид, егуге арналған ертіндіні дайындау үшін
ертінді 200 мг, флаконда 500 мг;
Метотрексат, таблетка 2,5 мг, 5 мг, егуге арналған ертіндіні
дайындау үшін лиофилизирленген ұнтақ, егуге арналған
ертінді 50 мг, 500 мг;
Клодрон кышқылы, капсулалар 400 мг, инфузия үшін
концентрат 60 мг/мл, капсулалар 400 мг;
Тамоксифен, таблетка 10 мг, 20 мг;
Летрозол, қапшықпен қапталған таблеткалар 2,5 мг;
Трипторелин, егуге арналған ертінді дайындауға арналған
ұнтақ 3,75 мг, 11,25 мг;
Ципротерон, таблетка 50 мг, егуге арналған майлы ертінді
1 0 0 м г / м л ;
Тиогуанин, таблетка 40 мг;
Меркаптопурин, таблетка 50 мг;
Преднизолон, таблеткалар 5 мг, егуге арналған ертінді 30 мг
/ 1 м л ;
Гидроксикарбамид, капсулалар 500 мг;
Флударарабина фосфат, егуге арналған лиофилизирленген
ұнтақ 50 мг, қапталған таблетка 10 мг;
Винкристин, егуге арналған лиофилизирленген ұнтақ, 1 мг
ф л а к о н д а ;
Винбластин, егуге ертінді дайындау үшін ұнтақ 5 мг, 10 мг
ф л а к о н д а ;
Капецитабин, таблетка 150 мг, 500 мг;
Темозоламид, капсулалар 250 мг;
Бортезомиб, егуге арналған ертінді дайындау үшін
лиофилизат 3,5 м г ;
Анастрозол, қапталған таблетка 1 мг;
Гозерелин, қорғаныш механизмі бар шприц-аппликатордағы
тері астына енгізілетін ұзак әсерлі депо-капсулалар 3,6 мг;
Сорафениб, таблеткалар 200 мг;
Фулвестрант, бұлшық етке енгізу үшін ертінді 250 мг/5 мл,
ш п р и ц - с а у ы т ;
Интерферон альфа 2 б 18 млн. ЕД;
Третиноин, капсулалар 10 мг;
Эпоэтин альфа, 40 000 МЕ;
Тегафур, капсулалар 400 мг;
Бевацизумаб, сауыттағы концентрат 400 мг/16 мл;
Золедрон кышқылы, инфузия үшін дайындауға арналған
концентрат 4 м г / 5 м л ;
Филграстим, 30 млн ЕД шприц сауыт;

| | | |
|--|--------------------|---|
| | | Иматиниб, таблеткалар 100 мг; Ломустин, капсулалар 40 мг; Интерферон альфа 2 а 4,5 млн ЕД, шприц-сауыт; Ондасетрон, таблеткалар 4 мг, 8 мг; Бір компонентті дренаждалатын қорғаныш пастасы бар жинақтағы илео/колостомды нәжіс сауыттар; |
| | Психикалық аурулар | Диазепам, егуге арналған ертінді ампулада 10 мг/2 мл, таблеткалар 5 мг, 10 мг; Оланзапин, таблеткалар 5 мг, 10 мг; Рисперидон, бұлшық етке енгізу үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 25 мг, 37,5 мг, 50 мг; Трифлуоперазин, таблеткалар 5 мг; Хлорпромазин, қабықшамен қапталған таблеткалар 25 мг, егуге арналған ертінді, 2,5%, драже 25 мг, 100 мг; Галоперидол, таблеткалар 1,5 мг, 5 мг, 10 мг; егуге арналған майлы ертінді 50 мг/мл; Амитриптилин, таблеткалар 25 мг, 50 мг, егуге арналған ертінді 20 мг/2 мл; Клозапин, таблеткалар 25 мг; Триексифенидил, таблеткалар 2 мг; Флуфеназин, егуге арналған ертінді 25 мг; Милнаципрана гидрохлорид, капсулалар 25 мг, 50 мг; Левомепромазин, қашықпен қапталған таблеткалар 25 мг; Венлафаксин, пролонгирленген әсері бар капсулалар 75 мг, 150 мг; Палиперидон, қашықпен қапталған таблеткалар (пролонгирленген әсері бар) 3 мг, 6 мг, 9 мг; Алпразолам таблеткалар 0,25, 1,0 мг; |
| | Эпилепсия | Вальпрой қышқылы, пролонгирленген әсері бар таблеткалар, капсулалар, пролонгирленген әсері бар түйіршектер, драже 150 мг, 250 мг, 300 мг, 500 мг, шәрбат 100 мл 50 мг/мл (баларап үшін); Карбамазепин, таблеткалар 100 мг, 200 мг; Бензобарбитал, таблеткалар 100 мг; Ламотриджин, таблеткалар, шайнайтын таблетклар 5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг; Топирамат, капсулалар 25 мг, 50 мг; |
| | Қантты диабет | Глибенкламид, таблеткалар 3,5 мг, 5 мг; Гликлазид, таблеткалар 30 мг, 80 мг; Глимепирид, таблеткалар 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг, 6 мг; Метформин, таблеткалар 500 мг, 850 мг, 1000 мг; Репаглинид, таблеткалар 0,5 мг, 1 мг, 2 мг; Пиоглитазон, таблеткалар 15 мг, 30 мг; Глюкагон, ертінді дайындауға арналған лиофилизат 1 мл; Метформин/глибенкламид, таблеткалар 500 мг/2,5 мг, 500 мг/5 мг; Акарбоза, таблеткалар 50 мг, 100 мг; тубтің микроальбуминурийн анықтайтын тест; |
| | Қантсыз диабет | Десмопрессин, таблеткалар 0,1 мг, 0,2 мг; |
| | Паркинсон ауруы | Триексифенидил, таблеткалар 2 мг; Леводопа + карбидопа, таблеткалар 250 мг/25 мг; |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | Бұлшық ет әлсіздігі | Пириодостигмин, таблеткалар 60 мг; егуге арналған ерітінді 5 мг/мл; Неостигмин, егуге арналған ерітінді 0,05%, таблеткалар 15 мг; |
| | Ревматоидті артрит және дәнекер тіндердің жүйелік закымдануы | Метотрексат, таблеткалар 2,5 мг; Азатиоприн, таблеткалар 50 мг; Хлорохин, таблеткалар 100 мг, 150 мг (фосфат немесе сульфат түрінде); Преднизолон, таблеткалар 5 мг; Сульфасалазин, таблеткалар 500 мг; Мофетила микофеңолат, капсулалар 250 мг; Циклоспорин, капсулалар 25 мг, 50 мг, 100 мг; Пенициламин, таблеткалар 150 мг, 250 мг; |
| | Протезделген жүрек қақпақшалары бар сыркаттар | Варфарин, таблеткалар 2,5 мг; |
| | Ұмытшақ склероз (созылмалы қайталмалы бағыттағы ауруларға) | (Интерферон - бета 1 а, 1 в, егуге арналған ерітінді 6 млн. МЕ, 12 млн. МЕ, егуге арналған ерітінді дайындауға арналған лиофилизирленген ұнтақ 9,6 млн. МЕ; |
| | Күшейтілген гломеруллярлы аурулар | Циклоспорин капсулалар 25 мг, 50 мг, 100 мг; Преднизолон, таблетка 5 мг; Циклофосфамид, драже 50 мг, егуге арналған ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 200 мг, сауытта 500 мг; Мофетила микофеңолат, капсулалар 250 мг; |
| | Гипофиздің гормонмен белсенді ісіктөр | Бромокриптин, 2,5 мг таблеткалар; |
| | Акромегалия (ЯМРТ диагнозына расталатын және құрамында өсу шегі гормонының көп болған жағдайда) | Бромокриптин, 2,5 мг таблетка; Октреотид, 50 мкг, 100 мкг инъекцияға арналған ерітінді, 2 мг, 3 мг инъекцияға арналған ерітіндіні дайындау үшін ұнтақ; Ланреотид, 30 мг сауыттағы лиофилденген микросфералар; 60 мг, 90 мг, 120 мг шығарылуы ұзак инъекцияға арналған ерітінді; |
| | Гипотиреоз Гипопаратиреоз Тиреотоксикоз | Левотироксин, 25 мкг, 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 125 мкг, 150 мкг таблетка; Дигидротахистерол, көлемі 15 мл сауыт-тамыздағы 1 мг/мл ішүгे арналған ерітінді; Тиамазол, 5 мг, 10 мг таблетка; |
| | Гепато–церебралды дистрофия | Пенициламин, 150 мг, 250 мг таблетка; |
| Барлық санаттар | Гемобластоздар мен апластикалық анемияны қоса алғандағы онкологиялық аурулар | Цитарабин, лиофилизат/инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилденген ұнтақ 100 мг |
| | Психикалық аурулар | Амисульприд, 100 мг, 200 мг таблетка, қабықшамен капталған таблетка 400 мг Рисперидон, 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг таблетка; ішке колдану үшін ерітінді 1 мг/мл, 30 мл 1 мг/мл |

2. Нысаналы ағымдағы трансфертер (субвенция) түрінде республикалық бюджет қаражаты

| | | |
|------------------------|---|---|
| Азаматтардың санаттары | Аурулар түрлері | Босатылатын препараттардың тізбесі |
| | Аутоиммундық бұзылулар (миастения) | Иммуноглобулин G (адамдік қалыпты) инфузияға арналған ерітінді 10% 100 мг/мл - 50 мл, 100 мг/мл - 20 мл |
| | Созылмалы бүйрек жетімсіздігі ренальдық анемиямен | Эпoэтин альфа немесе бетта 2000 бірл/шприц түтік; Темір сульфаты 320 мг табл/капс |
| | Гематология (гемобластоздар және апластикалық анемия) | Иматиниб 100 мг; |
| | Туберкулез | DOTS-терапия схемалары бойынша препараторлар; |
| | Қант диабеті | Инсулин адамдік қысқа әсерлі сауыттардағы инъекциялық ерітінді 100 бірл/мл; Инсулин адамдік қысқа әсерлі картридждардағы ерітінді 100 бірл/мл 3,0 мл (300 ед); Инсулин адам аналогі, ультракысқа әсерлі ерітінді 100 ед/мл картриджда 3 мл; Инсулин адамдік тәуліктік әсерлі (орташа) сауыттардағы суспензия 100 ед/мл; Инсулин адамдік тәуліктік әсерлі (орташа) картридждарда суспензия 100 бірл /мл - 3 мл; Инсулин адамдік орташа ұзактықтағы әсерлі қысқа әсерлі инсулинмен біркітіріп араластырылған сауыттардағы (30/70) суспензия 100 бірл /мл; Инсулин адамдік орташа ұзактықтағы әсерлі қысқа әсерлі инсулинмен біркітіріп араластырылған (30/70) суспензия 100 бірл /мл картридждарда 3,0 мл (300 бірл); Инсулин адам аналогі тәуліктік (шинысыз) әсерлі ерітінді 100 бірл /мл картридждарда 3,0 мл (300 бірл); Инсулин адам аналогі, ультракысқа әсерлі орташа ұзактықтағы әсерлі инсулинмен біркітірілген суспензия 100 бірл /мл картридждарда 3,0 мл (300 бірл); Микроальбуминурияны анықтауға арналған тест-жолақтар, жеткізу құралы, бақылау құралы + глюкометрге арналған тест-жолақтар (инсулиновтерапия алушы науқастар үшін); |
| Барлық санаттар | «B» және «C» Вирусты гепатиті | Интерферон альфа 2в инъекциялық ерітінді 18 млн МЕ/3 мл (6 доза 3 млн МЕ); Интерферон альфа 2а инъекциялық ерітінді 3 млн МЕ/0,5 мл, 4 , 5 млн МЕ / 0 , 5 мл ; Пегинтерферон альфа 2в 50 мкг, 80 мкг, 100 мкг, 120 мкг; Пегинтерферон альфа 2а 180 мкг; Рибаверин капсулалар/таблеткалар 200 мг, ішке қабылданатын ерітінді 40 мг/мл |
| | Гемофилия | Фактор VIII концентрат, лиофилизирленген ұнтақ 250МЕ, 5 0 0 М Е , 1 0 0 0 М Е ; фактор IX концентрат, лиофилденген ұнтақ, 200МЕ, 250МЕ, 5 0 0 М Е , 6 0 0 М Е , 1 0 0 0 М Е ; Октоког 250, 500, 1000; Эптаког 1, 2 және 2, 4; Антиингибиторлық антикоагулярлық кешен 500 ЕД; |
| | | Зидовудин, капсулалар 250 және 100 мг, үлпек қабықшамен қапталған таблеткалар 300 мг, инфузиялық ерітінді |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|--|
| | | АИТВ-инфекция, ЖИТС | құнарландырылған 10 мг/мл, ішке қабылданатын ерітінді 10 мг/мл (50 мг/5мл), сироп 200 мл; Ламивудин, ішке қабылданатын ерітінді 5 мг/мл, 240 мл, сироп 5 мг/мл, 240 мл үлпек қабықшамен қапталған таблеткалар 100 және 150 мг; Зидовудин/ламивудин, 300/150 мг, үлпек қабықшамен қапталған таблеткалар; Невирапин, таблетка 200 мг, ішке қабылданатын суспензия 50 мг / 5 мл ; Ставудин, капсула 30 мг, 40 мг, ішке қабылданатын ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 1мг/мл, 200 мл; Дианозин таблетка 100 мг, капсула 250 мг, 400 мг, ұнтақ 2 г ; Абакавир, таблетка 300 мг, ішке қабылданатын ерітінді 20 мг/мл; Нельфинавир, таблетка 250 мг, ішке қабылданатын ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 144 г; Лопиновир/ритонавир, ішке қабылданатын ерітінді 60 мл, капсулалар, таблетка 200/50 мг; Дарунавир, таблетка 300 мг; Эфавиренз, таблетка, 600 мг; Ритонавир, жұмсақ капсулалар 100мг, қабықшамен қапталған таблетка, 100 мг, сироп 80 мг/мл; |
| Балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер | Кистоздық фиброз муковисцидоз) | (| Дорназа альфа, ингаляциялық ерітінді, 2,5 мл; Ацетилцистеин, инъекциялық және ингаляциялық ұнтақ сауытта ; Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат, инъекциялық және ингаляциялық ерітінді дайындауға арналған лиофилизат сауытта, 500 мг; Панкреатин, капсулалар, 150 мг және 300 мг; |
| | Гоше ауруы | (| Имиглюцераза, инфузиялық ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 200 және 400 ЕД; |
| | Синдром Хантера мукополисахаридоз) | (| Ларонидаза, инфузиялық ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100 ЕД/мл; Идурсульфаза, инъекциялық ерітінді, 6мг/3мл; Галсульфаза, инъекциялық ерітінді, 1мг/1мл; |

* Жаңа туған нәрестелерге дәрі-дәрмек қобдиша бағдарлама әкімшісінің рұқсатымен және өнім жеткізуі және перзентхана арасындағы шарт үағдаластығы бойынша беріледі.

** бір жасқа дейін ерте жастан жасанды қоректендіруге ауыстыруға арналған абсолютті медициналық және әлеуметтік көрсеткіштер Тізбесі

*** баланы бір жасқа дейін ерте жастан жасанды/қоспалармен қоректендіруге ауыстыруға арналған салыстырмалы медициналық және әлеуметтік көрсеткіштер Тізбесі

Қазақстан

Республикасы

Денсаулық

сақтау

министрін

2009

жылғы

4

қыркүйектегі

N 446

бұйрығына

2-қосымша

Ескеरту. 2-қосымша жаңа редакцияда - КР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2011.08.12 № 532 (ресми жариялаған күнінен кейін күнтізбектік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

0,5 өтеге коэффициентімен, белгілі бір аурулары (жай-күйлері) амбулаториялық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде халыққа тегін және женілдікпен қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы буйымдар тізбесі

| | |
|--------------------------|--|
| | Метопролол, 50 мг, 100 мг таблетка Корvedилол, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг таблетка (косарланған жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі бар емделушілер үшін кардиологтың тағайындауы бойынша) Изосорбид динитраты, қысқа және ұзақ әсер ететін 10 мг; 20 мг; 40 мг; 60 мг таблетка ; аэрозоль |
| | Ацетилсалацил қышқылы, 75 мг, 100 мг, 150 мг таблетка; Клопидогрель, 75 мг, 100 мг, 150 мг қабықшамен қапталған таблетка; (ацетилсалацил қышқылы оларға жақпайтын сырқаттар үшін және коронарлық шунттау мен стенттеуден кейін кардиологтың тағайындауы бойынша) |
| Жүректің ишемиялық ауруы | Верапамил гидрохлориді, 40 мг, 80 мг таблетка Амлодипин, 5 мг; 10 мг таблетка; Мельдоний, капсула 250 мг, 500 мг; Нифедипин, 10 мг, 20 мг, 30 мг, 60 мг таблетка; Фозиноприл, 10 мг, 20 мг таблетка (косарланған жүрек, бүйрек функциясының жеткіліксіздігі бар емделушілер үшін); Триметазидин, қабықшамен қапталған 20 мг, 35 мг таблетка; Симвастатин, 10 мг, 20 мг таблетка қапшықпен қапталған; Розувастатин, 10 мг, 20 мг таблетка қапшықпен қапталған; Изосорбид-5-мононитрат, таблеткалар 20 мг, 40 мг, 60 мг, ретард капсулалар; Дилтиазем, 30 мг, 60 мг, 90 мг таблетка; Фенофибрат, 200 мг капсула; |
| Артериалық гипертензия | Эналаприл, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг таблетка, 1,25 мг/1 мл ампуладағы ерітінді Лизиноприл, 5 мг, 10 мг, 20 мг таблетка; Фозиноприл 10 мг, 20 мг ; Периндоприл, 5 мг, 10 мг таблетка; Метопролол, 50 мг; 100 мг таблетка; Корведилол, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг таблетка (косарланған жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі бар емделушілер үшін кардиологтың тағайындауы бойынша); Бисопролол, 5 мг, 10 мг таблетка (косарланған жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, өкпе аурулары бар емделушілер үшін кардиологтың тағайындауы бойынша); Индапамид, 2,5 мг таблетка; ұзақ әсер ететін 1,5 мг таблетка; Эпрасартан мезилат, 400 мг, 600 мг қапшықпен қапталған таблетка; Амлодипин, 5 мг, 10 мг таблетка; Нифедипин, 10 мг, 20 мг, 30 мг, 60 мг таблетка; Моксонидин, 0,2 мг, 0,4 мг таблетка; |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | Кандесартан, 8 мг, 16 мг таблетка; Валсартан, 80 мг, 160 мг таблетка; Лозартан калия/гидрохлортиазид 50 мг/12,5 мг; |
| Әкпенің созылмалы обструктивтік ауруы | Фенотерол гидробромиді + ипратропий бромиді, 500 мкг + 250 мкг/мл ингаляцияға арналған ертінді, 50 мкг + 21 мкг/дозалы аэрозоль; Теофиллин, 100 мг, 200 мг, 300 мг таблетка капсула, 350 мг ретард капсула, та блектка; Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат, 160 мкг/4,5 мкг, 80 мкг/4,5 мкг пластмассада ингаляторда ингаляцияға арналған ұнтақ; Ацетилцистеин, 200 мг ішүге арналған ертінді дайындау үшін гранулдар, 600 мг та блектка郎; Тиотропия бромид, 18 мкг ингаляцияға арналған капсулалар; Амоксициллин + клавулон қышқылы, 125 мг, 250 мг 500 мг дисперлеуші таблеткалар; |
| Қабыну | Амоксициллин + клавулан қышқылы, 625 мг таблетка; Азитромицин, 500 мг таблетка, 250 мг капсула; Цефуроксим, 250 мг, 500 мг таблетка; Амброксол, 30 мг таблетка, ампуладағы 15 мг/2 мл инъекцияға арналған ертінді; 15 мг/5 мл; 30 мг/5 мл сироп; 7,5 мг/мл ертінді; Ацетилцистеин, 200 мг ішүге арналған ертінді дайындау үшін гранулдар, 600 мг көпіршік таблеткалар; |
| Ойық жара ауруы | Амоксициллин, 250 мг, 500 мг таблетка, 250 мг, 500 мг капсула, 250 мг/5 мл ішілеңтін сүспензия; Кларитромицин, 250 мг, 500 мг таблетка; Метронидазол, 250 мг таблетка; Висмут трикалий дицитраты, қабықшамен қапталған 120 мг таблетка; Омепразол, 20 мг капсула; Фамотидин, 40 мг таблетка; |
| Созылмалы жүрек кемістігі | Периндоприл, 4 мг, 5 мг, 8 мг, 10 мг таблетка; Невиболол, 2,5 мг, 5 мг таблетка; Валсартан + гидрохлортиазид, 80 мг/12,5 мг, 160 мг/12,5 мг үлпек қабықшамен қапталған таблеткалар; Кандесартан, 8 мг, 16 мг таблетка; Спиронолактон, 25 мг таблетка, 100 мг капсулалар; Эналаприл + гидрохлортиазид, 10 мг + 25 мг, 10 мг + 12,5 мг таблетка; Рамиприл, 5 мг, 10 мг таблетка; Бисопролол, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг таблетка; Лозартан калия + гидрохлоротиазид 50 мг/ 12,5 мг, 25 мг таблетка; Дигоксин, 0,25 мг таблеткалар; Фуросемид, 40 мг таблеткалар; |
| Аритмиялар | Амиодарон, 200 мг таблеткалар; Пропафенон, 150 мг, 300 мг таблетка; Этализин, 50 мг таблетка; Соталол, 160 мг таблетка, 5 мл ампуладағы ертінді; Варфарин, 2,5 мг, 3 мг, 5 мг таблетка; |