

## **Об утверждении Правил изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения**

### *Утративший силу*

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 60. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2019 года № 476

**Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.06.2019 № 476.**

В соответствии со статьей 68 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр  
Республики Казахстан

К. Масимов

Утверждены  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 16 января 2012 года № 60

## **Правила изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения**

### **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (далее – Правила) определяют порядок изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

2. Изготовление лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется субъектами в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, имеющими соответствующую лицензию на изготовление лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) изготовление лекарственных препаратов – фармацевтическая деятельность, связанная с изготовлением лекарственных форм в аптеках, а также с приобретением лекарственных субстанций, хранением, контролем качества, оформлением и реализацией изготовленных лекарственных препаратов;

2) изготовление изделий медицинского назначения – фармацевтическая деятельность, связанная с изготовлением изделий медицинского назначения в аптеках, магазинах медицинской техники и изделий медицинского назначения и магазинах оптики;

3) надлежащая производственная практика – национальный стандарт в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, устанавливающий требования к организации производства, производственного процесса и проведения контроля при производстве лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

4) стерильные лекарственные препараты – лекарственные средства в определенной лекарственной форме, прошедшие процесс стерилизации на отсутствие живых организмов.

**Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.**

4. Изготовление лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется на основе лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Казахстан, за исключением лекарственных субстанций, произведенных в условиях надлежащей производственной практики.

5. Технология изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, изготавливаемых в условиях аптеки, магазина медицинской техники и изделий медицинского назначения и магазина оптики осуществляется в соответствии с требованиями общих статей Государственной фармакопеи Республики Казахстан, отдельных фармакопейных статей, зарубежных фармакопей, признанных действующими на территории Республики Казахстан, нормативных документов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения.

6. В медицинских организациях, не имеющих в составе аптеки с правом изготовления лекарственных препаратов, не допускается изготовление и (или) расфасовка лекарственных препаратов, переключивание лекарственных препаратов из одной упаковки в другую, замена этикеток.

## **2. Порядок изготовления лекарственных препаратов**

7. Лекарственные препараты изготавливаются с учетом следующих условий:

1) соблюдением правил выписывания рецептов, соответствия прописанных доз возрасту больного, норм единовременного отпуска, совместимости ингредиентов, входящих в состав лекарственного препарата;

2) соблюдением технологии изготовления лекарственных препаратов;

3) обеспечением лекарственного препарата соответствующей маркировкой и упаковкой;

4) обеспечением надлежащего отпуска лекарственного препарата с предоставлением пациенту объективной информации о лекарственных препаратах доступными понятиями и советами по их применению и хранению.

8. Изготовление лекарственных препаратов осуществляется:

1) по рецептам врачей;

2) по требованиям медицинских организаций;

3) в виде внутриаптечной заготовки;

4) расфасовки лекарственных средств и лекарственного растительного сырья.

9. При изготовлении лекарственных препаратов допускаются отклонения, в пределах норм, допустимых при изготовлении лекарственных препаратов (в том числе гомеопатических) в аптеке, допустимых при расфасовке промышленной продукции в аптеке, допустимой погрешности при измерении величины кислотно-щелочного баланса согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящим Правилам.

10. Условия стерилизации, хранения и сроков годности лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке, установлены согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

11. В медицинские организации лекарственные препараты из аптеки должны отпускаться только уполномоченному медицинскому персоналу по доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **2.1. Порядок изготовления стерильных лекарственных препаратов**

12. В асептических условиях изготавливают:

1) лекарственные препараты для новорожденных;

2) растворы для инъекций и инфузий;

3) ирригационные растворы, вводимые в полости, не содержащие микроорганизмов;

4) жидкие лекарственные препараты для новорожденных и детей до одного года;

5) препараты в виде жидкой лекарственной формы, содержащие антибиотики и другие антимикробные вещества, а также предназначенные для нанесения на раны и ожоговые поверхности;

6) капли глазные, офтальмологические растворы для орошений и примочки;

7) концентрированные растворы (в том числе гомеопатические разведения);

8) жидкие лекарственные препараты в виде внутриаптечной заготовки.

13. Не допускаются:

1) изготовление стерильных лекарственных препаратов при отсутствии данных о химической совместимости входящих в них лекарственных веществ, технологии и режиме стерилизации;

2) одновременное изготовление на одном рабочем месте нескольких стерильных растворов, содержащих лекарственные вещества с различными наименованиями или одного наименования, но в разных концентрациях.

14. Результаты контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий регистрируются в журнале регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий по прилагаемой форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью руководителя аптеки и скреплен печатью аптеки.

15. Контроль стерильных растворов на отсутствие механических включений проводится до и после стерилизации.

Необходимо проверять объем растворов во флаконах (бутылках) и качество их укупорки (металлический колпачок "под обкатку" не должен прокручиваться при проверке вручную, раствор не должен выливаться при опрокидывании флакона (бутылки)).

16. Флаконы с растворами после укупорки маркируются путем надписи, штамповки на крышке или с использованием металлических жетонов с указанием наименования и концентрации.

17. Стерилизация растворов должна проводиться не позднее трех часов от начала изготовления, под контролем специалиста (фармацевта или провизора).

Не допускается повторная стерилизация растворов.

Регистрация параметров стерилизации производится в журнале регистрации режима стерилизации исходных лекарственных веществ, изготовленных лекарственных препаратов, вспомогательных материалов, посуды по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью руководителя аптеки и скреплен печатью аптеки.

18. Номенклатура концентратов, полуфабрикатов и внутриаптечной заготовки лекарственных препаратов, изготавливаемых в аптеке, ежегодно

утверждается аккредитованной испытательной лабораторией, с которой заключен договор о контрольно-аналитическом обслуживании. В данный перечень включают лекарственные препараты, содержащие совместимые активные и вспомогательные вещества, на которые имеются методики анализа для полного химического контроля с установленными сроками годности.

**Сноска. Пункт 18 в редакции постановления Правительства РК от 21.01.2013 № 15 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).**

### **3. Порядок изготовления изделий медицинского назначения**

19. Изделия медицинского назначения изготавливаются с учетом следующих условий:

1) при использовании их по назначению (при эксплуатации) в соответствии с инструкциями и информацией, предоставляемыми изготовителем изделий они обеспечивали безопасность и не подвергали риску состояние здоровья пациентов, пользователей или других лиц;

2) сохранения их характеристик при хранении и транспортировке;

3) исключить или максимальным образом уменьшить риск инфицирования пациентов, пользователей и других лиц, а также контаминации самих изделий.

20. Технические характеристики и функциональные свойства изделий медицинского назначения не должны ухудшаться в течение срока службы изделия медицинского назначения, указанного изготовителем, под действием внешних факторов, и подвергать угрозе здоровье и безопасность пациентов, пользователей при нормальной эксплуатации изделий в условиях, соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя.

21. Если изделия медицинского назначения предназначены для введения лекарственных средств, они должны быть совместимыми с этими лекарственными средствами с учетом функциональных свойств изделий медицинского назначения согласно назначению, условий применения и хранения этих лекарственных средств.

22. Изготовление медицинской оптики производится на станках, специально предназначенных для обработки оптических линз в соответствии с рецептом, выписанным к конкретному пациенту.

23. В обязательном порядке проводится проверка точности изготовленных очков на специальном оборудовании (диоптриметр) в присутствии клиента, на соответствие с данными рецепта.

## **Нормы отклонений, допустимые при изготовлении лекарственных препаратов (в том числе гомеопатических) в аптеке**

1. Отклонения, допустимые в массе отдельных доз при расфасовке порошков, в том числе порошковыми дозаторами, определяются на прописанную дозу одного порошка.

Отклонения, допустимые в общей массе гомеопатических тритураций, определяются на прописанную массу тритураций.

Прописанная масса, г	Отклонения %
1	2
До 0,1	±15
Свыше 0,1 до 0,3	±10
Свыше 0,3 до 1	±5
Свыше 1 до 10	±3
Свыше 10 до 100	±3
Свыше 100 до 250	±2
Свыше 250	±0,3

2. Отклонения, допустимые в общей массе гранул гомеопатических (в том числе при фасовке) для одной упаковки:

Прописанная масса, г	Отклонения %
1	2
До 1	±5
Свыше 1 до 100	±3

3. Отклонения, допустимые в массе отдельных доз суппозиторий и пилюль:

1) определяют среднюю массу взвешиванием (с точностью до 0,01 г) не менее 10 суппозиторий или пилюль. При изготовлении менее 10 штук взвешивают все суппозитории;

2) отклонения в массе суппозиторий и пилюль от средней массы определяют взвешиванием каждого суппозитория или пилюли с минимальной выборкой 5 штук;

3) допустимые отклонения от средней массы не должны превышать:

для суппозиторий  $\pm 5\%$ ;

для пилюль с массой до 0,3 г  $\pm 10\%$ ;

для пилюль массой свыше 0,3 г  $\pm 5\%$ .

4. Отклонения, допустимые в массе прописанных доз отдельных лекарственных веществ в порошках, пилюлях и суппозиториях (при изготовлении методом выкатывания или выливания) определяются на дозу каждого вещества, входящего в эти лекарственные препараты:

Прописанная масса, г	Отклонения %
1	2
До 0,02	±20
Свыше 0,02 до 0,05	±15
Свыше 0,05 до 0,2	±10
Свыше 0,2 до 0,3	±8
Свыше 0,3 до 0,5	±6
Свыше 0,5 до 1	±5
Свыше 1 до 2	±4
Свыше 2 до 5	±3
Свыше 5 до 10	±2
Свыше 10	±1

5. Отклонения, допустимые в общем объеме жидких лекарственных препаратов при изготовлении массо-объемным способом, а также в подпунктах 7, 9 следует иметь в виду, что отклонения предусмотрены для жидких лекарственных препаратов при изготовлении с использованием как концентратов, так и сухих веществ:

Прописанный объем, мл	Отклонения, %
1	2
До 10	±10
Свыше 10 до 20	±8
Свыше 20 до 50	±4
Свыше 50 до 150	±3
Свыше 150 до 200	±2
Свыше 200	±1

6. Отклонения, допустимые при фасовке растворов для инъекций, изготавливаемых в виде внутриаптечной заготовки:

Прописанный объем, мл	Отклонения, %
1	2
До 50	±10
Свыше 50	±5

При отмеривании (и фасовке) жидкостей после слива струей дается выдержка на слив капель: для невязких жидкостей - в течение одной минуты, для вязких - в течение трех минут.

7. Отклонения, допустимые при определении содержания отдельных лекарственных веществ в жидких лекарственных препаратах при изготовлении массо-объемным способом:

Прописанная масса, г	Отклонения %
1	2
До 0,02	±20
Свыше 0,02 до 0,1	±15
Свыше 0,1 до 0,2	±10
Свыше 0,2 до 0,5	±8
Свыше 0,5 до 0,8	±7
Свыше 0,8 до 1	±6
Свыше 1 до 2	±5
Свыше 2 до 5	±4
Свыше 5	±3

8. Отклонения, допустимые в массе жидких лекарственных препаратов при изготовлении способом по массе:

Прописанная масса, г	Отклонения %
1	2
До 10	±10
Свыше 10 до 20	±8
Свыше 20 до 50	±5
Свыше 50 до 150	±3
Свыше 150 до 200	±2
Свыше 200	±1

9. Отклонения, допустимые в массе входящих отдельных лекарственных веществ в жидких лекарственных препаратах при изготовлении способом по массе, и в мазях:

Прописанная масса, г	Отклонения %
1	2
До 0,1	±20
Свыше 0,1 до 0,2	±15
Свыше 0,2 до 0,3	±12
Свыше 0,3 до 0,5	±10
Свыше 0,5 до 0,8	±8
Свыше 0,8 до 1	±7
Свыше 1 до 2	±6

Свыше 2 до 10	±5
Свыше 10	±3

Отклонения, допустимые в определении содержания входящих отдельных лекарственных веществ в жидких лекарственных препаратах при изготовлении способом по массе или массо-объемным способом, а также в мазях, определяются не на концентрацию в процентах, а на прописанную массу входящего вещества в эти лекарственные препараты согласно подпунктам 7, 9 настоящего Приложения.

При изготовлении 10 мл 2 % раствора пилокарпина гидрохлорида берут массу навески 0,2 г, для которой допускается отклонение  $\pm 10\%$ . При анализе достаточно установить, что было взято не менее 0,18 г и не более 0,22 г пилокарпина гидрохлорида.

#### 10. Отклонения, допустимые в общей массе мазей:

Прописанная масса, г	Отклонения %
1	2
До 5	±15
Свыше 5 до 10	±10
Свыше 10 до 20	±8
Свыше 20 до 30	±7
Свыше 30 до 50	±5
Свыше 50 до 100	±3
Свыше 100	±2

11. Отклонения, допустимые в концентратах при содержании лекарственного вещества:

до 20 % не более  $\pm 2\%$  от обозначенного процента;

свыше 20 % не более  $\pm 1\%$  от обозначенного процента.

В данном пункте указаны отклонения от концентрации (в процентах), допустимые в концентратах при изготовлении их как массо-объемным способом, так и способом по массе.

12. Отклонения, допустимые в гомеопатических тритурациях, растворах и разведениях жидких лекарственных препаратов:

1) при содержании лекарственного вещества 10 % (первое десятичное разведение – Д1) не более  $\pm 5\%$  от обозначенного процента;

2) при содержании лекарственного вещества 1 % (второе десятичное разведение – Д2) не более  $\pm 5\%$  от обозначенного процента;

Д3) при содержании лекарственного вещества 0,1 % (третье десятичное разведение – Д3) не более  $\pm 10\%$  от обозначенного процента.

В данном пункте указаны отклонения от концентрации (в процентах), допустимые в гомеопатических triturациях, растворах и разведениях жидких лекарственных препаратов при изготовлении их в виде концентратов и полуфабрикатов.

При определении допустимых отклонений в проверяемых лекарственных препаратах, изготовленных в виде серий внутриаптечной заготовки, следует пользоваться нормами отклонений, приведенных в подпунктах 1 - 10 данного приложения, а также в действующей нормативной документации, регламентирующей изготовление и контроль качества различных лекарственных препаратов в аптеке.

При изготовлении лекарственных препаратов в виде серий внутриаптечной заготовки отклонения, допустимые в массе входящих отдельных веществ, определяются на массу входящего каждого вещества, взятую для изготовления требуемого объема (или массы) данной серии (в одной емкости от одной загрузки препарата).

При изготовлении 2 л 0,9 % раствора натрия хлорида берут массу входящего вещества 18 г, для которой допускается отклонение  $\pm 3$  %. При химическом контроле достаточно установить, что было взято не менее 17,46 г, и не более 18,54 г натрия хлорида.

Отклонения, допустимые в массе входящих отдельных веществ в лекарственных препаратах, изготовленных в виде серий внутриаптечной заготовки и изъятых из аптеки для проверки, определяются как указано выше в пункте 2 и пункте 3.

При рассмотрении изъятого на проверку лекарственного препарата по прописи "раствора натрия хлорида 0,9 % - 200 мл" при химическом контроле достаточно установить, что в растворе содержится не менее 1,71 г и не более 1,89 г натрия хлорида (отклонение  $\pm 5$  % согласно пункта 7 данного приложения).

13. При проверке лекарственных препаратов, изготавливаемых в гомеопатической аптеке по индивидуальным прописям, следует пользоваться нормами отклонений, приведенными в пунктах 1 - 4, 8 - 10 данного приложения.

Приложение 2  
к Правилам изготовления  
лекарственных препаратов и  
изделий медицинского назначения

## **Нормы отклонений, допустимые при расфасовке промышленной продукции в аптеке**

1. Отклонения, допустимые при расфасовке по массе таблеток, драже, капсул (ангро) для одной упаковки:

--	--

Измеряемая масса, г	Отклонения, %
1	2
Свыше 10 до 100	±3
Свыше 100 до 250	±2
Свыше 250	±0,3

На расфасовку поштучно таблеток, драже, капсул в индивидуальную упаковку допустимые отклонения не устанавливаются. Недовложенные единицы лекарственных препаратов считаются браком.

2. Отклонения, допустимые при расфасовке жидких лекарственных препаратов по объему (для одной упаковки):

Измеряемый объем, мл	Отклонения, %
1	2
До 5	±8
Свыше 5 до 25	±5
Свыше 25 до 100	±3
Свыше 100 до 300	±1,5
Свыше 300 до 1000	±1
Свыше 1000	±0,5

3. Отклонения, допустимые при расфасовке жидких лекарственных препаратов по массе (для одной упаковки):

Измеряемая масса, г	Отклонения, %
1	2
До 5	±4
Свыше 5 до 100	±2
Свыше 100 до 5000	±0,6

4. Отклонения, допустимые при расфасовке мазей и линиментов по массе (для одной упаковки):

Измеряемый объем, мл	Отклонения, %
1	2
До 5	±5
Свыше 5 до 50	±4
Свыше 50 до 100	±2,5
Свыше 100 до 5000	±1

5. Отклонения, допустимые при расфасовке ваты (для одной упаковки):

Измеряемая масса, г	Отклонения, %
1	2
Свыше 50 до 100	±8
Свыше 100 до 250	±5
Свыше 250	±4

## Норма допустимой погрешности при измерении величины кисотно-щелочного баланса

Метод измерения	Максимальная погрешность в единицах кисотно-щелочного баланса при измерении (измерения кислото-щелочного баланса проводят в сравнении с водой очищенной или водой для инъекций)	
	с интервалом рН 1-2	с интервалом рН 0,3-0,7
1	2	3
Потенциометрический	0,6	0,05
Индикаторной бумагой	1	0,3

Приложение 4  
к Правилам изготовления  
лекарственных препаратов и  
изделий медицинского назначения

## Условия стерилизации, хранения и сроков годности лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке

### 1. Стерильные растворы во флаконах и бутылках, герметично укупоренные резиновыми пробками под обкатку

№ п/п	Наименование	Состав	Срок годности в сутках при t <sup>0</sup> не выше 25 <sup>0</sup> С	Условия хранения	Режим стерилизации (температура, время)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Растворы для инъекций и инфузий</b>					
1	Раствор анальгина 25 %; 50 %	Анальгина 250 г; 500 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
2	Раствор апоморфина гидрохлорид 1 %	Апоморфина гидрохлорида 10 г Анальгин 0,5 г Цистеина 0,2 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М-40 мл	30	В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу	

		Воды для инъекций до 1 л			120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
3	Раствор атропина сульфата 0,05 %; 0,1 %; 1 %; 2,5 %; 5 %	Атропина сульфат 0,5 г; 1 г; 10 г; 25 г; 50 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
4	Раствор "Ацесоль"	Натрия ацетата 2 г Натрия хлорида 5 г Калия хлорида 1 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
5	Вода для инъекций		30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
6	Раствор глицерина 10 %	Глицерина (в пересчете на безводный) 100 г Натрия хлорида 9 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
7	Раствор глюкозы 5 %; 10 %; 20 %; 25 %	Глицерина (в пересчете на безводную) 50 г; 100 г; 200 г; 250 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М до рН 3,0-4,1 Натрия хлорида 0,26 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
8	Раствор глюкозы 5 % с калия хлоридом 0,5 % или 1 %	Глюкозы (в пересчете на безводную) 50 г Калия хлорида 5 г или 10 г Воды для инъекций до 1 л	60		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
9	Раствор глюкозы 10 % солевой	Глюкозы (в пересчете на безводную) 10 г Калия хлорида 2 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,4 г Воды для инъекций до 1 л	90		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
		Глюкозы (в пересчете на безводную) 22,05 г			

10	Раствор глюкозы цитратный	Кислоты лимонной 7,3 г Натрия цитрата (в пересчете на безводный) 16, 18 г (водного 22 г) Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
11	Раствор дибазола 0,5 %; 1 %; 2 %	Дибазола 5 г; 10 г; 20 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М-10 мл Воды для инъекций до 1 л	60-для 0,5 % и 1 % 30-для 2 %		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
12	Раствор дикаина 0,1 %; 0,25 %; 0,3 %	Дикаина 1 г; 2,5 г; 3 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М - 10 м Воды для инъекций до 1 л	30	В запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
13	Раствор дикаина 1 %; 2 %	Дикаина 10 г; 20 г Натрия тиосульфата 0,5 г Воды для инъекций до 1 л	90	В запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
14	Раствор димедрола 1 %; 2 %	Димедрола 10 г; 20 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
15	Раствор "Дисоль"	Натрия хлорида 6 г Натрия ацетата 2 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
16	Жидкость Петрова кровезаменяющая	Натрия хлорида 15 г Калия хлорида 0,2 г Кальция хлорида 1 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
17	Раствор калия хлорида 0,5 %; 1 %; 3 %; 5 %; 7,5 %; 10 %	Калия хлорида 5 г; 10 г; 30 г; 50 г; 75 г; 100 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
18	Раствор калия хлорида 0,25 %; 0,5%; 1% с глюкозой или натрия хлоридом	Калия хлорида 2,5 г; 5 г; 10 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 50 г или натрия хлорида 9 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.

19	Раствор кальция глюконата 10 %	Кальция глюконата 100 г Воды для инъекций до 1 л	7		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
20	Раствор кальция 0,25 %; 0,5 %; 1 %; 5 %; 10 %	Кальция хлорида 2,5 г; 5 г; 10 г; 50 г; 100 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
21	Раствор кардиоплегический № 1	Натрия хлорида 4,5 г Калия хлорида 2,22 г Магния хлорида (в пересчете на безводный) 0,4 г Кальция глюконата 0,3 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 1 г Маннита 18 г Воды для инъекций до 1 л	6 мес.		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
22	Раствор кардиоплегический № 3	Натрия хлорида 4,5 г Калия хлорида 1,125 г Магния хлорида (в пересчете на безводный) 3,232 г Кальция глюконата 0,3 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 1 г Маннита 19 г Воды для инъекций до 1 л	12 мес.		120 <sup>0</sup> С - 8 мин.
23	Раствор "Квартасоль"	Натрия гидрокарбоната 1 г Натрия ацетата 2,6 г Натрия хлорида 4,75 г Калия хлорида 1,5 г Воды для инъекций до 1 л	90		120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
24	Раствор кислоты аминапроновой 5 %	Кислоты аминапроновой 50 г Натрия хлорида 9 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
25	Раствор кислоты аскорбиновой 5 %; 10 %	Кислоты аскорбиновой 50 г; 100 г Натрия гидрокарбоната 23,85 г; 47,70 г Натрия сульфита безводного 2 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
26	Раствор кислоты глютамино-	Кислоты глютаминовой 10 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном	

	вой 1 %			от света месте	
27	Раствор кислоты никотиновой 1 %	Кислоты никотиновой 10 г Натрия гидрокарбоната 7 г Воды для инъекций до 1 л	60	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
28	Раствор кофеина- бензоата 10 %; 20 %	Кофеина-бензоата натрия 100 г; 200 г Раствора натрия гидроокиси 0,1 М - 4 мл Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
29	Раствор магния сульфата 10 %; 20 %; 25 %; 33 %	Магния сульфата 100 г; 200 г; 250 г; 330 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
30	Раствор метиленово- го синего 0,02 %; 1 %	Метиленового синего 0,2 г; 10 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
31	Раствор натрия бензоата 15 %	Натрия бензоата 150 г Воды для инъекций до 1 л	30		
32	Раствор натрия бромида 5 %; 10 %; 20 %	Натрия бромида 50 г; 100 г; 200 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
33	Раствор натрия гидрокар- боната 3 %; 4 %; 5 %; 7 %	Натрия гидрокарбоната 30 г; 40 г; 50 г; 70 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
34	Раствор натрия гидрокарбо- ната 3 %; 4 %; 5 %; 7 %; 8,4 % стабилизи- рованный	Натрия гидрокарбоната 30 г; 40 г; 50 г; 70 г; 84 г Трилона Б 0,1 г (для 3-5 % раствора) 0,2 г (для 7-8,4 % раствора) Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
35	Раствор натрия гидроцитра- та 4 %; 5 %; 6 %	Натрия гидроцитрита 40 г; 50 г; 60 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С- 8 мин.
36	Раствор натрия йодида 5 %;	Натрий йодида 50 г; 100 г; 200 г	30	В защищенном	

	10 %; 20 %	Воды для инъекций до 1 л		от света месте	120 <sup>0</sup> С-8 мин.
37	Раствор натрия парааминосалицилата 3 %	Натрия парааминосалицилата 30 г Натрия сульфата безводного 5 г Воды для инъекций до 1 л	7	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С-8 мин.
38	Раствор натрия салицилата 3 %; 10 %	Натрия салицилата 30 г; 100 г Натрия метабисульфита 1 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С-8 мин.
39	Раствор натрия хлорида 0,45 %; 0,9 %; 5,85 %; 10 %	Натрия хлорида 4,5 г; 9 г; 58,5 г; 100 г Воды для инъекций до 1 л	90		120 <sup>0</sup> С-8 мин.
40	Раствор натрия цитрата 4 %; 5 %	Натрия цитрата (в пересчете на сухое вещество) 40 г; 50 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С-8 мин.
41	Раствор никотиамида 1 %; 2 %; 2,5 %; 5 %	Никотиамида 10 г; 20 г; 25 г; 50 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С-8 мин.
42	Раствор новокаина 0,25 %; 0,5 %; 1 %; 2 %	Новокаина 2,5 г; 5 г; 10 г; 20 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М до рН 3,8-4,5 Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С-8 мин.
43	Раствор новокаина 2 %; 5 %; 10 %	Новокаина 20 г; 50 г; 100 г Раствор кислоты хлороводородной 0,1 М - 4 мл; 6 мл; 8 мл Натрия тиосульфата 0,5 г Воды для инъекций до 1 л	90	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С-8 мин.
44	Раствор норсульфазол-натрия 5 %; 10 %	Норсульфазол-натрия (в пересчете на сухое вещество) 50 г; 100 г Воды для инъекций до 1 л	5 % - 30 10 % - 10	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С-8 мин.
45	Раствор папаверина гидрохлорида 2 %	Папаверина гидрохлорида 20 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С-8 мин.
		Натрия хлорида 9 г Калия хлорида 0,2 г			

46	Раствор Рингера	Кальция хлорида 0,2 г Натрия гидрокарбоната 0,2 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С-8 мин.
47	Раствор Рингера-ацетата	Натрия хлорида 5,26 г Натрия ацетата (в пересчете на безводный) 4,10 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,28 г Магния хлорида (в пересчете на безводный) 0,14 г Калия хлорида 0,37 г Кислоты хлороводородной разведенной (8 %) 0,2 мл Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
48	Раствор Рингера-Локка (препарат получают путем смешивания равных объемов двух отдельно приготовленных и простерилизованных растворов, один из которых - раствор натрия гидрокарбоната, другой - глюкозы с солями)	Натрия хлорида 9 г Калия хлорида 0,2 г Кальция хлорида 0,2 г Натрия гидрокарбоната 0,2 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 1 г Воды для инъекций до 1 л	Срок хранения каждого из растворов 30 суток		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
49	Раствор синьки Эванса 0,5 %	Синьки Эванса (в пересчете на безводную) 5 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
50	Раствор спазмолитина 0,5 %;	Спазмолитина 5 г; 10 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М - 20 мл	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.

	1 %	Воды для инъекций до 1 л			
51	Раствор стрептоцида растворимого 5 %; 10 %	Стрептоцида растворимого (в пересчете на сухое вещество) 50 г; 100 г Натрия тиосульфата 1 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
52	Раствор тримекаина 0,25 %; 0,5 %; 1 %; 2 %; 5 %	Тримекаина (в пересчете на безводный) 2,5 г; 5 г; 10 г; 20 г; 50 г Натрия хлорида 8,5 г; 8 г; 7 г; 5 г Воды для инъекций до 1 л	30+	В защищенном от света месте Раствор тримекаина 5 % не изотонируют	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
53	Раствор "Трисоль"	Калия хлорида 1 г Натрия хлорида 5 г Натрия гидрокарбоната 4 г Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
54	Раствор фурагина растворимого 0,1 % с натрия хлоридом 0,9 %	Фурагина растворимого 10 % с натрия хлоридом 90 % - 10 г Воды для инъекций до 1 л	7	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.
55	Раствор "Хлосоль"	Калия хлорида 1,5 г Натрия хлорида 4,75 г Натрия ацетата 3,6 Воды для инъекций до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
56	Раствор этазолнатрия 10 %; 20 %	Этазол-натрия (в пересчете на сухое вещество) 100 г; 200 г Натрия сульфита (безводного) 3,5 г Натрия гидроцитрата 1 г; 2 г Воды для инъекций до 1 л	180	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
57	Раствора эфедрина гидрохлорида 2 %; 3 %; 5 %	Эфедрина гидрохлорида 20 г; 30 г; 50 г Воды для инъекций до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.

Время стерилизационной выдержки указано для растворов объемом до 100 миллилитров. С увеличением объема раствора время стерилизации увеличивают в соответствии со статьей "Стерилизация" Государственной фармакопеи Республики Казахстан.

## 2. Другие стерильные растворы

--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
58	Раствор глюкозы 50 % (для интраамнеального введения)	Глюкозы (в пересчете на безводную) 500 г Воды очищенной до 1 л	90		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
59	Раствор кислоты борной 2 %	Кислоты борной 20 г Воды очищенной до 1 л	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
60	Раствор метилурацила 0,7 %	Метилурацила 7 г Воды очищенной до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
61	Раствор натрия тетрабората 20 % в глицерине	Натрия тетрабората 20 г Глицерина 80 г	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
62	Раствор натрия хлорида 20 % (для интраамнеального введения)	Натрия хлорида 200 г Воды очищенной до 1 л	90		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
63	Раствор фурацилина 0,01 %; 0,02 %	Фурацилина 0,1 г; 0,2 г Натрия хлорида 9 г Воды очищенной до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
64	Раствор хлоргексидина биглюконата 0,02 %; 0,05 %	Раствора хлоргексидина биглюконата 20 % - 1 мл; 2,5 мл Воды очищенной до 1 л	90		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.
65	Раствор этакридина лактата 0,1 %	Этакридина лактата 1 г Воды очищенной до 1 л	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.

## 2. Капли глазные, офтальмологические растворы для орошения, концентрированные растворы для изготовления глазных капель

№ п/п	Наименование и состав лекарственного	Срок годности в сутках при t		Условия хранения	Режим стерилизации (темпе-	Примечание
		не	вы-			

	препарата	ше 25 <sup>0</sup> С	3-5 <sup>0</sup> С		ратура, время)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Капли глазные</b>						
1	<p>Раствор амидопирина 2 %</p> <p>Состав: Амидопирина 0,2 г Натрия хлорида 0,06 г Воды очищенной до 10 мл</p>	30	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
2	<p>Раствор атропина сульфата 0,25 %; 0,5 %; 1 %</p> <p>Состав: Атропина сульфата 0,025 г; 0,05 г; 0,1 г Натрия хлорида 0,088 г; 0,085 г; 0,08 г Воды очищенной до 10 мл</p>		30	В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
3	<p>Раствор гоматропина гидробромида 0,5 %, 1 %</p> <p>Состав: Гоматропина гидробромида 0,05 г; 0,1 г Натрия хлорида 0,082 г; 0,074 г Воды очищенной 10 мл</p>	30	30	В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
4	<p>Раствор дикаина 0,25 %; 0,5 %; 1 %</p> <p>Состав: Дикаина 0,025 г; 0,05 г; 0,1 г Натрия хлорида 0,085 г; 0,081 г; 0,072 г Воды очищенной до 10 мл</p>		30	В запирающемся шкафу	100 <sup>0</sup> С - 30 мин.	
5	<p>Раствор дикаина 0,5 %; 1 %; 2 %; 3 %</p> <p>Состав: Дикаина 0,05 % 0,1 г; 0,2 г; 0,3 г Натрия хлорида 0,081 г; 0,072 г; 0,053 г; 0,035 г Натрия тиосульфата 0,005 г Воды очищенной до 10 мл</p>	120	0,5 % - 90 1 % - 30	В запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Раствор дикаина 0,5 % готовят без стабилизатора. Раствор дикаина 2 %-3 % хранить в холодильнике нельзя
	Дикаина 0,05 г					

6	Цинка сульфата 0,05 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл	30	30	В запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
7	Дикаина 0,05 г Цинка сульфата 0,05 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл Резорцина 0,05	30	30	В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	После стерилизации и охлаждения раствора, содержащего дикаин, кислоту борную, цинка сульфат, добавляется резорцин в асептических условиях
8	Раствор димедрола 0,25 %; 0,5 % Состав: Димедрола 0,025 г; 0,05 г Натрия хлорида 0,085 г; 0,08 г Воды очищенной до 10 мл	90	90	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
9	Димедрола 0,02 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл		30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
10	Раствор калия йодида 3 % Состав: Калия йодида 0,3 г Воды очищенной до 10 мл	30	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
11	Калия йодида 0,05 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,05 г Натрия хлорида 0,055 г Воды очищенной до 10 мл	90	90	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
12	Раствор кальция хлорида 3 % Состав: Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,3 г Воды очищенной до 10 мл	30			120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
	Раствор кислоты аскорбиновой 0,2 %					

13	Состав: Кислоты аскорбиновой 0,02 г Натрия хлорида 0,086 г Воды очищенной свежепрокипяченной до 10 мл	2	7	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
14	Раствор клофелина 0,125 %; 0,25 %; 0,5 % Состав: Клофелина 0,0125 г; 0,025 г; 0,05 г Натрия хлорида 0,09 г Воды очищенной до 10 мл	90	90	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
15	Раствор колларгола 2 %; 3 % Состав: Колларгола 0,2 г; 0,3 г Воды очищенной до 10 мл	30	30	В защищенном от света месте	Готовят в асеп- тичес- ких ус- ловиях	Раствор можно фильтровать через бумажный обеззоленный фильтр
16	Раствор левомицетина 0,2 % Состав: Левомецетина 0,02 г Натрия хлорида 0,09 г Воды очищенной до 10 мл	7	7	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
17	Левомецетина 0,01 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл	7	30	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С - 30 мин.	
18	Левомецетина 0,02 г Цинка сульфата 0,03 г Резорцина 0,05 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл		15	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С - 30 мин.	После стерилизации и охлаждения раствора, содержащего левомицетин, кислоту борную и цинка сульфат добавляется резорцин в асептических условиях.
19	Мезатона 0,02 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл	7	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
	Раствор мезатона 1 %; 2 % Состав:					

20	Мезатона 0,1 г; 0,2 г Натрия хлорида 0,062 г; 0,034 г Воды очищенной до 10 мл		7		В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
21	Раствор мезатона 1 % Состав: Мезатона 0,1 г Натрия хлорида 0,056 г Натрия метабисульфита 0,01 г Воды очищенной до 10 мл	30	30		В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
22	Натрия гидрокарбоната 0,05 г Натрия тетрабората 0,05 г Натрия хлорида 0,04 г Воды очищенной до 10 мл	30	30			120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
23	Раствор натрия йодида 3 % Состав: Натрия йодида 0,3 г Воды очищенной до 10 мл	30	30		В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
24	Натрия йодида 0,4 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,4 г Воды очищенной до 10 мл	30	30		В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
25	Раствор новокаина 1 % Состав: Новокаина 0,1 г Натрия хлорида 0,072 г Воды очищенной до 10 мл	30	30		В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
26	Новокаина 0,05 г Цинка сульфата 0,02 г Резорцина 0,1 г Раствора кислоты борной 1 % - 10 мл	10	30		В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	После стерилизации и охлаждения раствора, содержащего новокаин, кислоту борную и цинка сульфат, добавляется резорцин в асептических условиях
							После стерилизации и охлаждения раствора,

27	Новокаина 0,05 г Цинка сульфата 0,02 г Резорцина 0,1 г Кислоты борной 0,1 г Раствора адреналина гидрохлорида 0,1 % - 10 капель Воды очищенной до 10 мл	10	20	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	содержащего новокаин, кислоту борную, цинка сульфат, Добавляется резорцин и раствор адреналина гидрохлорида в асептических условиях
28	Раствор норсульфазол натрия 10 % Состав: Норсульфазол натрия (в пересчете на сухое вещество) 1 г Воды очищенной до 10 мл	10	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Под пробку необходимо подкладывать нелакированный целлофан (ГОСТ 7730 -74), промытый водой очищенной
29	Раствор пилокарпина гидрохлорида 1 %; 2 %; 4 %; 6 % Состав: Пилокарпина гидрохлорида 0,1 г; 0,2 г; 0,4 г; 0,6 г Натрия хлорида 0,068 г; 0,046 г Воды очищенной до 10 мл	30	30	В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
30	Пилокарпина гидрохлорида 0,1 г Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл		30	В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
31	Раствор рибофлавина 0,02 % Состав: Рибофлавина 0,002 Натрия хлорида 0,09 г Воды очищенной до 10 мл	90	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
32	Рибофлавина 0,001 г Кислоты аскорбиновой 0,03 г Кислоты борной 0,2 г Воды очищенной свежепрокипяченной до 10 мл	2	7	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С - 30 мин.	

33	Рибофлавина 0,002 г Кислоты аскорбиновой 0,02 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,2 г Натрия хлорида 0,05 г Воды очищенной свежeproкипяченной до 10 мл	2	7	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
34	Рибофлавина 0,002 г Калия йодида 0,2 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,2 г Трилона Б 0,003 г Воды очищенной до 10 мл	30	30	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
35	Рибофлавина 0,002 г Калия йодида 0,2 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,2 г Трилона Б 0,003 г Раствор метилцеллюлозы 1 % - 10 мл	30	30	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С - 30 мин.	
36	Рибофлавина 0,002 г Кислоты аскорбиновой 0,02 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,2 г Натрия метабисульфита 0,01 г Трилона Б 0,003 г Воды очищенной свежeproкипяченной до 10 мл	7	30	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
37	Рибофлавина 0,002 г Кислоты аскорбиновой 0,02 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,2 г Натрия метабисульфита 0,01 г Трилона Б 0,003 г Раствора метилцеллюлозы 1 % - 10 мл	7	30	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
	Раствор скополамина гидробромида 0,1 %; 0,25 % Состав: Скополамина			В защищенном		

38	гидробромида (в пересчете на безводный) 0,01 г; 0,025 г Натрия хлорида 0,09 г; 0,087 г Воды очищенной до 10 мл		30	от света месте, в запирающемся шкафу	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
39	Раствор сульфапиридазин натрия 10 %; 20 % Состав: Сульфапиридазин- натрия 1 г; 2 г Воды очищенной до 10 мл	30	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
40	Раствор сульфацил-натрия 20 % Состав: Сульфацил-натрия 2 г Натрия метабисульфита 0,05 г Раствора гидроксид натрия 1 М - 0,18 мл Воды очищенной до 10 мл		30	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С - 30 мин.	
41	Раствор сульфацил-натрия 10 %; 20 %; 30 % Состав: Сульфацил-натрия 1 г; 2 г; 3 г Натрия тиосульфата 0,015 г Раствора кислоты хлороводородной 1 М - 0,035 мл Воды очищенной до 10 мл	30	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Раствор можно использовать для инс- тиляции в глаза но- ворожденным детям.
42	Раствор фетанола 3 %; 5 % Состав: Фетанола 0,3 г; 0,5 г Натрия хлорида 0,048 г; 0,02 г Воды очищенной до 10 мл	2 (3 % раст- вор) 15 (5 % раст- вор)		В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
43	Раствор фетанола 3 % Состав: Фетанола 0,3 г Натрия метабисульфита 0,01 г Воды очищенной до 10 мл	30	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	

44	<p>Раствор физостигмина салицилата 0,25 %</p> <p>Состав:</p> <p>Физостигмина салицилата 0,025 г</p> <p>Кислоты никотиновой 0,003 г</p> <p>Натрия метабисульфита 0,003 г</p> <p>Натрия хлорида 0,08 г</p> <p>Воды очищенной до 10 мл</p>	30	30	В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу	120 <sup>0</sup> С – 8 мин	
45	<p>Раствор флуоресцеин - натрия 0,5 %</p> <p>Состав:</p> <p>Флуоресцеин - натрия 0,05 г</p> <p>Натрия хлорида 0,075 г</p> <p>Воды очищенной до 10 мл</p>	30	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин	
46	<p>Раствор фурациллина 0,02 %</p> <p>Состав:</p> <p>Фурациллина 0,002 г</p> <p>Натрия хлорида 0,085 г</p> <p>Воды очищенной до 10 мл</p>	30	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С- 8 мин.	
47	<p>Раствор хинина гидрохлорида 1 %</p> <p>Состав:</p> <p>Хинина гидрохлорида 0,1 г</p> <p>Натрия хлорида 0,076 г</p> <p>Воды очищенной до 10 мл</p>	120	120	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
48	<p>Цинка сульфата 0,03 г</p> <p>Новокаина 0,1 г</p> <p>Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл</p>		30	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
49	<p>Цинка сульфата 0,025 г</p> <p>Димедрола 0,03 г</p> <p>Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл</p>		30	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
50	<p>Цинка сульфата 0,025</p> <p>Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл</p>		30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
51	<p>Раствор этилморфина гидрохлорида 2 %</p> <p>Состав:</p> <p>Этилморфина</p>	30	30	В защищенном от света месте, в	100 <sup>0</sup> С –	

	гидрохлорида 0,2 г Натрия хлорида 0,06 г Воды очищенной до 10 мл			запирающемся шкафу	30 мин.	
52	Раствор эфедрина гидрохлорида 3 % Состав: Эфедрина гидрохлорида 0,3 г Воды очищенной до 10 мл	30	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
2. Офтальмологические растворы для орошения						
53	Солевой офтальмологический раствор Состав: Натрия хлорида 5,3 г Калия хлорида 0,75 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,48 г Натрия ацетата (в пересчете на безводный) 3,9 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,8 г Кислоты хлороводородной разведенной (8 %) 0,05 мл Воды очищенной до 1 л	30			120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Применяют при микрохирургических операциях на глаза.
54	Солевой офтальмологический раствор (с магния хлоридом) Состав: Натрия хлорида 5,3 г Калия хлорида 0,75 г Кальция хлорида (в пересчете на безводный) 0,48 г Натрия ацетата (в пересчете на	30			120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Применяют при микрохирургических операциях на глаза.
1	2	3	4	5	6	7
	безводный) 3,9 г Глюкозы (в пересчете на безводную) 0,8 г Магния хлорида (в пересчете на					

	безводный) 0,3 г Кислоты хлороводородной разведенной (8 %) 0,05 мл Воды очищенной до 1 л					
<b>3. Концентрированные растворы для изготовления глазных капель</b>						
55	Раствор калия йодида 20 %	30		В защищенном от света месте	1200С – 8 мин.	
56	Раствор кислоты аскорбиновой 2 %; 5 %; 10 %	5	30	В защищенном от света месте	1000С - 30 мин.	Раствор изготавливается на воде очищенной свежепроки- пяченной. При фасовке раствора флаконы заполняются доверху.
57	Раствор кислоты борной 4 %	30			120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
58	Раствор натрия тиосульфата 1 %	30			100 <sup>0</sup> С - 30 мин.	
59	Раствор рибофлавина 0,02 %	90	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
60	Рибофлавина 0,02 г Кислоты аскорбиновой 2 г или 10 г Воды очищенной свежепрокипяченной до 100 мл	5	30	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С - 30 мин.	При фасовке раствора флаконы заполняются доверху.
61	Рибофлавина 0,02 г Кислоты борной 4 г Воды очищенной до 100 мл	30		В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С - 30 мин.	
1	2	3		5	6	7
62	Рибофлавина 0,02 г Кислоты никотиновой 0,1 г Воды очищенной до 100 мл	30		В защищенном от света месте	100С - 30 мин.	
63	Раствор цинка сульфата 1 % или	30			120 <sup>0</sup> С –	

	2 %				8 мин.	
64	Раствор цитраля 0,02 %	2	В защищенном от света месте			Изготавли- вается в асептических условиях на стерильной воде очищенной
Вскрытые флаконы с концентратами для глазных капель должны быть использованы в течение суток.						

### 3. Лекарственные препараты для новорожденных детей

№№ п/п	Наименование и состав лекарственного препарата	Срок годности в сутках при t не выше 250С)	Условия хранения	Режим стери- лизации (темпе- ратура, время)	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>1. Растворы для внутреннего употребления</b>					
1	Вода очищенная	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
2	Раствор глюкозы 5 % 10 % 25 %	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Готовят без стабилизатора
3	Раствор глюкозы 5 % - 100 мл Кислоты аскорбиновой 1 г	5	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	Готовят на очищенной свежепрокипя- ченной воде. При фасовке флаконы заполняют доверху
4	Раствор глюкозы 10 % или 20 % - 100 мл Кислоты глутаминовой 1 г	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
5	Раствор дибазола 0,01 %	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
1	2	3	4	5	6
					Раствор димедрола следует использовать только в концентрации 0,02 % в

6	Раствор димедрола 0,02 %	30	В защищенном от света месте	1200С – 8 мин.	фасовке по 10 мл. В условиях родильного дома следует воздерживаться от применения растворов димедрола, учитывая его выраженное седативное действие, угнетающее влияние на ЦНС и возможность развития интоксикации
7	Раствор калия ацетата 0,5 %	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
8	Раствор калия йодида 0,5 %	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Фасовка раствора не должна превышать 20 мл.
9	Раствор кальция глюконата 1 %; 3 %; 5 %	7		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Растворяют в горячей воде.
10	Раствор кальция лактата 3 %; 5 %	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Готовят с учетом фактического содержания влаги в препарате.
11	Раствор кальция хлорида 3 %	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	Для приготовления раствора целесообразно использовать 10 - 50 % концентрат.
1	2	3	4	5	6
12	Раствор кислоты аскорбиновой 1 %	5	В защищенном от света месте	100 <sup>0</sup> С – 30 мин.	Готовят на свежeproкипяченной воде очищенной. При фасовке флаконы заполняют доверху.

13	Раствор кислоты глутаминовой 1 %	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
14	Раствор кислоты никотиновой 0,05 %	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
15	Раствор кислоты хлороводородной 1 %	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	При приготовлении используют разведенную кислоту хлоро- водородную (8,2-8,4 % ГФ Х статья 18), принимая ее за 100 %
16	Раствор кофеина- бензоата натрия 1 %	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
17	Раствор кофеина- бензоата натрия 0,25 г или 0,5 г Натрия бромид 0,5 г или 1 г Воды очищенной до 100 мл	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
18	Раствор Кислоты лимонной 1 г Натрия гидроцитрата 5 г Воды очищенной до 100 мл	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
19	Раствор магния сульфата 5 %; 10 %; 25 %	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
20	Раствор натрия бромид 1 %	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин	
21	Раствор натрия хлорида 0,9 %	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
1	2	3	4	5	6
22	Раствор Новокаина 0,5 г Раствора кислоты хлороводородной 0,1 М - 0,3 мл Воды очищенной до 100 мл	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
	Раствор		В защищенном	120 <sup>0</sup> С –	

23	пиридоксина гидрохлорида 0,2 %	30	от света месте	8 мин.	
24	Раствор эуфиллина 0,05 %; 0,5 %	15	В защищенном от света места	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
Растворы внутреннего употребления для новорожденных детей готовят на воде очищенной.					
<b>2. Растворы, масла для наружного применения</b>					
25	Раствор бриллиантового зеленого спиртовой 1 %	2 года			
26	Раствор калия перманганата 5 %	2	В защищенном от света месте	Готовят в асеп- тических условиях	Раствор готовят на стерильной очищенной воде, разливают в стерильные флаконы.
27	Раствор колларгола 2 %	30	В защищенном от света месте	Готовят в асеп- тических условиях	Раствор готовят на стерильной очищенной воде, разливают в стерильные флаконы.
28	Раствор натрия тетрабората 10 % в глицерине	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
29	Раствор перекиси водорода 3 %	15	В защищенном от света месте	Готовят в асеп- тических условиях	Раствор готовят на стерильной очищенной воде, разливают в стерильные флаконы, укупоривают полиэтиленовым пробками и завинчиваемыми крышками.
1	2	3	4	5	6
30	Фурацилина 0,02 г Раствора натрия хлорида 0,9 % или 10 % до 100 мл	30		120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
31	Раствор этакридина лактата 0,1 %	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
					Масла стерилизуют в бутылках для

32	Масло персиковое	30	В прохладном защищенном от света месте	180 <sup>0</sup> С – 30 мин.	крови, вместимостью 50 мл, укупоренных резиновыми пробками марки ИР - 21 под обкатку. Использование пробок марки 25 П (красного цвета) не рекомендуется.
33	Масло оливковое	30	В прохладном защищенном от света месте	180 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
34	Масло подсолнечное	30	В прохладном защищенном от света месте	180 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
35	Масло вазелиновое	30	В прохладном защищенном от света месте	180 <sup>0</sup> С – 30 мин.	
<b>3. Глазные капли</b>					
36	Раствор колларгола 2 %; 3 %	30	В защищенном от света месте	Готовят в асептических условиях	Раствор можно фильтровать через бумажный обеззоленный фильтр
37	Раствор сульфацил-натрия 10 %; 20 %; 30 % Состав: Сульфацил-натрия 1 г; 2 г; 3 г Натрия тиосульфата 0,015 г	30	В защищенном от света месте	120 <sup>0</sup> С – 8 мин.	
1	2	3	4	5	6
	Раствора кислоты хлороводородной 1 М 0,035 мл Воды очищенной до 10 мл				
<b>4. Порошки</b>					
38	Дибазола 0,001 г Сахара (глюкозы) 0,2	90	В защищенном от света месте	Готовят в асептических условиях	
			В защищенном	Готовят	

39	Димедрола 0,002 г Сахара (глюкозы) 0,2 г	90	от света месте	в асеп- тических условиях	
40	Фенобарбитала 0,002 г или 0,005 г Сахара (глюкозы) 0,2 г	90	В защищенном от света месте	Готовят в асеп- тических условиях	
41	Эуфиллина 0,003 г Сахара 0,2 г	20	В защищенном от света месте	Готовят в асеп- тических условиях	Запрещается замена сахара в порошках с эуфиллином на глюкозу
42	Присыпка ксероформа 10,0 г	15	В защищенном от света месте	180 <sup>0</sup> С – 30 мин.	Стерилизуют в открытом виде. Укупоривают флаконы обработанными резиновыми пробками под обкатку в асептических условиях.
<b>5. Мази</b>					
43.	Мазь танина 1 % Состав: Танина 1 г Воды очищенной 1 г Вазелина 98 г	20	В прохладном защищенном от света месте	Готовят в асеп- тических условиях	Танин растворяют в минимальном количестве воды и смеси- вают со сте- рильной осно- вой. Основу стерилизуют при темпера- туре 180 <sup>0</sup> С - 30 мин.
1	2	3	4	5	6
44	Мазь танина 5 % Состав Танина 5 г Воды очищенной Ланолина безводного по 5 г Вазелина 85 г	20	В прохладном защищенном от света месте	Готовят в асеп- тических условиях	Танин растворяют в минимальном количестве воды и смеси- вают со сте- рильной осно- вой. Основу стерилизуют при температуре 180 <sup>0</sup> С - 30 мин.

## 4. Мази

№ № п/ п	Наименование и состав лекарственной формы	Срок год- ности в сут- ках	Хранение 30-50С	Усло- вия стери- лизации	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>1. Мази</b>					
1	Мазь, содержащая анальгин и натрия цитрат Состав:Анальгин 5 г Натрия цитрата 10 г Эмульгатора Т-2 14 г Масла вазелинового 12 г Вазелина 20 г Глицерина 3 г Воды очищенной 36 г	90	В защищенном от света месте		
2	Мазь димедроловая 5 % Состав № 1: Димедрол 5 г Вазелина 86,5 г Ланолина безводного 9,5 г	30	В защищенном от света месте		Данный состав основы следует использовать, если при выписывании мази димедроловой 5 % не указана основа. Обладает поверхностным действием.
3	Мазь димедроловая 5 % Состав № 2 Димедрол 5 г Масла подсолнечного Воды очищенной Ланолина безводного по 31,6 г	30	В защищенном от света месте		Обладает проникающим, резорбтивным действием.
1	2	3	4	5	6
4	Мазь теофиллиновая 10 % Состав: Теофиллина 10 г Эмульгатора Т-2 9 г Вазелина 54 г Воды очищенной 27 г Димексида 10 г	1 год	В защищенном от света месте		
5	Мазь фурациллиновая 0,2 % Состав: Фурацилина 0,2 г Масла вазелинового 0,6 г Вазелина 99,2 г	30	В защищенном от света		

			месте		
<b>2. Мази глазные</b>					
6	<p>Основа для глазных мазей 100 г Состав:</p> <p>Ланолина безводного 10 г</p> <p>Вазелина сорта для глазных мазей 90 г</p>	30	В защищенном от света месте		
7	<p>Мазь пилокарпиновая 1 % или 2 % Состав:</p> <p>Пилокарпина гидрохлорида 0,1 г или 0,2 г</p> <p>Основы для глазных мазей 10 г</p>	30	В защищенном от света месте, в запирающемся шкафу	Готовят в асептических условиях	
8	<p>Мазь тиаминовая 0,5 % или 1 % Состав:</p> <p>Тиамин бромид 0,05 г или 0,1 г</p> <p>Основы для глазных мазей 10 г</p>	30	В защищенном от света месте	Готовят в асептических условиях	
<p>Основу для глазных мазей получают путем сплавления ланолина безводного и вазелина сорта для глазных мазей в фарфоровой чашке при нагревании на водяной бане. Расплавленную основу процеживают через несколько слоев марли, фасуют в сухие простерилизованные стеклянные банки, обвязывают пергаментной бумагой и стерилизуют в воздушном стерилизаторе при температуре 180°C в течение 30-40 минут или при температуре 200°C в течение 15-25 минут в зависимости от объема мази.</p>					

## 5. Порошки

№№ п/п	Наименование, состав	Срок годности в сутках при t не выше 250С	Условия хранения	Режим стерилизации	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	<p>Порошки противопалительного и антацидного действия</p> <p>Алюминия гидроксида 0,35 г</p> <p>Магния оксида 0,40 г</p> <p>Висмута нитрата основного 0,20 г</p> <p>Лактозы (декстрина) 2,05 г</p>	1 год	В сухом, защищенном от света месте		
2	<p>Дибазола 0,003 г;</p> <p>0,005 г; 0,008 г</p> <p>Сахара (глюкозы) 0,2 г</p>	90	В сухом, защищенном от света месте	Готовят в асептических условиях	Для детей
			В сухом,		

3	Димедрола 0,005 г Сахара (глюкозы) 0,2 г	90	защищенном от света месте	Готовят в асептических условиях	Для детей
4	Димедрола 0,005 г Кальция глюконата 0,25 г Сахара (глюкозы) 0,1 г	1 год	В сухом, защищенном от света месте	Готовят в асептических условиях	Для детей
5	Кальция глюконата 0,05 г Сахара (глюкозы) 0,2 г	1 год	В сухом месте	Готовят в асептических условиях	Для детей
6	Кальция глюконата Сахара (глюкозы) по 0,1 г	1 год	В сухом месте	Готовят в асепти- ческих условиях	Для детей

## 6. Микстуры и растворы для внутреннего употребления

№ п/п	Наименование, состав	Срок годности в сутках при t0		Условия хранения	Примечание
		не выше 250С	3-50С		
1	2	3	4	5	6
1	Микстура Кватера Состав: Настоя корневища с корнями валерианы из 10 г и листьев мяты из 4 г - 200 мл Натрия бромида 3 г		10	В защищенном от света месте	
	Амидопирин 0,6 г Кофеина-бензоата натрия 0,4 г Магния сульфата 0,8 г				
1	2	3	4	5	6
2	Настоя травы термопсиса из 0,6 г – 200 мл Натрия гидрокарбоната Натрия бензоата по 4 г		10	В защищенном от света месте	
3	Раствор кислоты хлороводородной 1 % - 100 мл Пепсина 2,0		10		
4	Раствор кислоты хлороводородной 1 % или 2 %	10			
5	Раствор калия йодида 0,25 %	10		Во флаконах оранжевого стекла в защищенном от света месте	

6	Раствор новокаина 0,25 % или 0,5 %	10		Во флаконах оранжевого стекла в защищенном от света месте	
7	Раствор магния сульфата 10 %; 25 %; 33 %; 50 %	15			
8	Раствор кальция хлорида 5 % или 10 %	10			
9	Раствор Рингера Состав: Натрия хлорида 0,9 г Натрия гидрокарбоната Калия хлорида Кальция хлорида 0,02 г Воды очищенной до 100 мл	5	10		
10	Вода мятная	30			
11	Вода укропная	30			

## 7. Концентрированные растворы для изготовления жидких лекарственных препаратов

№ п/п	Наименование, состав	Срок годности в сутках при t <sup>0</sup>		Условия хранения	Примечание
		не выше 25 <sup>0</sup> С	3-5 <sup>0</sup> С		
1	2	3	4	5	6
1	Раствор аммония хлорида 20 %	15			
2	Раствор барбитал-натрия 10 %	10			
1	2	3	4	5	6
3	Раствор гексаметилентетрамина 10 %; 20 %; 40 %	20			
4	Раствор глюкозы 5 %	2			
5	Раствор глюкозы 10 %; 20 %; 40 %; 50 %	4	10		
6	Раствор калия бромиды 20 %	20		В защищенном от света месте	
7	Раствор калия йодида 20 %	15		В защищенном от света месте	
8	Раствор кальция хлорида 10 %; 20 %	10			
9	Раствор кальция	30			

	хлорида 50 %				
10	Раствор кислоты аскорбиновой 5 %	5			
11	Раствор кислоты хлороводородной 10 %	30			
12	Раствор кофеина-бензоата натрия 5 %	7	15		
13	Раствор кофеина бензоата натрия 20 %	20			
14	Раствор магния сульфата 10 %; 25 %; 50 %	15			
15	Раствор натрия бензоата 10 %	20			
16	Раствор натрия бромида 20 %	20		В защищенном от света месте	
17	Раствор натрия гидрокарбоната 5 %	4	10		
18	Раствор натрия салицилата 40 %	20		В защищенном от света месте	
19	Раствор темисала 10 %	10		В защищенном от света месте	
20	Раствор хлоралгидрата 10 %	5		В защищенном от света месте	
21	Раствор хлоралгидрата 20 %	15		В защищенном от света месте	

## 8. Капли для носа и растворы для наружного применения

№ п/п	Наименование, состав	Срок годности в сутках при t <sup>0</sup>		Условия хранения	Примечание
		не выше 25 <sup>0</sup> C	3-5 <sup>0</sup> C		
1	2	3	4	5	6
1	Димедрола 0,01 г Эфедрина гидрохлорида 0,1 г Масла ментолового 1 % 10 капель Масла косточкового 10 г	30		В защищенном от света месте	
2	Раствор кислоты борной 2 % с димедролом 1 % Состав: Димедрола 0,1 г Кислоты борной 0,2 г Воды очищенной до 10 мл	30		В защищенном от света месте	
3	Раствора кислоты борной 2 % - 10 мл Раствора адреналина гидрохлорида 0,1	10	30	В защищенном	

	% - 10 капель			от света месте	
4	Раствор колларгола 3 %	30		В защищенном от света месте	
5	Раствор протаргола 2 %	30		В защищенном от света месте	
6	Раствор Люголя 0,25 % на глицерине Состав: Йода 0,25 г Калия йодида 0,5 г Глицерина 98,5 г Воды очищенной 0,75 мл	30		Во флаконах оранжевого стекла в защищенном от света месте	
7	Раствор натрия тетрабората 20 % в глицерине Состав: Натрия тетрабората 20 г Глицерина 80 г	30			
8	Раствор пероксида водорода 3 % Состав: Пероксид водорода (27,5-40 %) - от 7,5 до 11 г (6,8-9,9 мл) в зависимости от фактического содержания пероксида водорода в исходном препарате Натрия бензоата 0,05 г Воды очищенной до 100 мл	2 года		В прохладном, защищенном от света месте	
9	Раствор фурациллина 0,02 %	20		В защищенном от света месте	
1	2	3	4	5	6
10	Раствор стрептоцида растворимого 0,8 % с фурациллином 0,01 % Состав: Стрептоцида растворимого 0,08 г Фурациллина 0,001 г Натрия тиосульфата 0,01 г Воды очищенной до 10 мл	30		В защищенном от света месте	

## 9. Полуфабрикаты для изготовления наружных жидкостей, каплей для носа, порошков и мазей

№ п/п	Наименование, состав	Срок годности в сутках при t0		Условия хранения	Примечание
		не выше 25 <sup>0</sup> С	3-5 <sup>0</sup> С		
1	2	3	4	5	6

1	Раствор димедрола 1 %	20		В защищенном от света месте	
2	Раствор кислоты борной 2 %	15	30		
3	Раствор натрия тиосульфата 60 %	15			
4	Раствор натрия хлорида 0,9 %	7	15		
5	Раствор стрептоцида растворимого 0,8 %	2	10	В защищенном от света месте	
6	Раствор этиакридина лактата 0,02 %; 0,05 %; 0,1 %; 0,2 %	15			
7	Раствор эфедрина гидрохлорида 10 %	15		В защищенном от света месте	
8	Цинка окиси Талька поровну	30			
9	Цинка окиси Талька Крахмала поровну	30			
10	Ланолина водного Вазелина поровну Состав: Ланолина безводного 168 г Вазелина 240 г Воды очищенной 72 мл	15		В защищенном от света месте	
11	Ланолин водный Состав: Ланолина безводного 70 г Воды очищенной 30 г	15		В защищенном от света месте	
1	2	3	4	5	6
12	Ланолина безводного Масла подсолнечного Воды очищенной поровну	5		В защищенном от света месте	

## 10. Гомеопатические гранулы и водно-спиртовые разведения (потенции)

№ п/п	Наименование, состав	Срок годности в сутках при t <sup>0</sup>		Условия хранения	Примечание
		не выше 25 <sup>0</sup> С	3-5 <sup>0</sup> С		
1	2	3	4	5	6
1	Гранулы гомеопатические	2 года		В сухом, защищенном от света месте	
	Промежуточные водно-			В защищенном от света месте, в	

2	спиртовые гомеопатические разведения (потенции)	6 мес	хорошо укупоренной таре
---	---	-------	-------------------------

## 11. Сроки годности других лекарственных препаратов

№ п/п	Лекарственный препарат	Срок годности не более (суток)
1	Водные растворы, содержащие бензилпенициллин и глюкозу	1
2	Глазные капли	2
3	Настои, отвары, слизи	2
4	Эмульсии, суспензии	3
5	Инъекционные растворы и инфузии	2
6	Остальные лекарственные препараты	10

Приложение 5  
к Правилам изготовления  
лекарственных препаратов и  
изделий медицинского назначения

форма

## Журнал

### регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий

Дата	№ п/п (он же номер анализа)	№ рецепта, наименование медицинской организации	Исходные ЛС		Наименование и объем изготовленного раствора	Подпись изготовившего раствор	Фильтрация и фасовка (розлив)	
			наименование	количество				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

№ анализов до и после стерилизации (указывается через дробь)	Количество бутылок (флаконов) готовой продукции, поступившей для отпуска	Подпись допустившего готовую продукцию к отпуску (ответственное лицо - заведующий отделом, провизор)
17		18
		19

продолжение таблицы

№ анализов до и после стерилизации (указывается через дробь)	Количество бутылок (флаконов) готовой продукции, поступившей для отпуска	Подпись допустившего готовую продукцию к отпуску (ответственное лицо - заведующий отделом, провизор)

Приложение 6  
к Правилам изготовления  
лекарственных препаратов и  
изделий медицинского назначения

форма

## Журнал

### регистрации режима стерилизации исходных лекарственных веществ, изготовленных лекарственных препаратов, вспомогательных материалов, посуды

Дата	№ п/п	№ серии, № рецепта, наименование медицинской организации с названием от- деления	Наименование	Количество		Условия стерилизации		Термотест	Подпись проводившего стерилизацию
				до стерилизации	после стерилизации	температура	время (указывается время начала и окончания стерилизации)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10